



# AQUAVOLTA®

## Hydrogen Infuser & H<sub>2</sub> Inhalator



HANDBUCH

KARL HEINZ ASENBAUM



### Wasserstoffwasser trinken & Wasserstoffgas atmen







Henry  
Cavendish

Der englische Adelige Henry Cavendish (1731 – 1810), einer der reichsten Menschen seiner Zeit, konnte sich ein Leben als abgeschiedener Wissenschaftler leisten und erforschte zwei damals völlig spleenige Dinge:

1. Ein entflammbares Gas, das man später Wasserstoff nannte.
  2. Die Schwerkraft, für deren Berechnung es zwar schon die Formeln seines Landsmanns Isaac Newton gab, für deren Existenz es aber keinerlei Beweis gab. Er machte aus der Annahme und dem für jedermann offensichtlichen Vorhandensein der Schwerkraft eine unumstößliche Tatsache. Warum sind diese beiden Dinge heute so wichtig für uns?
- Nun, Wasserstoff „H“ stellt in unserem Sonnensystem 75 % der Gesamtmasse dar und sogar 93 % aller Atome dort sind Wasserstoffatome. Letztlich gingen alle anderen Elemente auf den Wasserstoff zurück. Sie wurden nach dem Urknall von den Sternen erbrütet. „Nett zu wissen!“ könnten Sie jetzt sagen. „Das merke ich mir für die nächste Quiz-Show!“ Wäre da nicht die Frage: „Warum ist ausgerechnet auf unserer Erde mit 0,12 % der Gesamtmasse so viel weniger Wasserstoff als im Rest des Universums?“ Und damit sind wir beim zweiten Lebensthema von Henry Cavendish, der Schwerkraft.
  - Wasserstoff ist nämlich so winzig klein, dass er der Erde davonfliegt, denn er ist 15 mal leichter als Luft. Mit etwa 5 Meter pro Sekunde verschwindet er Richtung Weltall, wo er herkommt. Denn die Schwerkraft greift nicht nach ihm, sogar auch dann nicht, wenn er im Doppelpack, als  $H_2$  Gas davonfliegt. Darum sind es auf der Erdoberfläche nur 2,9 % und nicht 75 % Wasserstoff wie im Universum (ohne dunkle Materie). Und das, obwohl bei uns scheinbar so viel Wasserstoff als  $H_2O$  in den Weltmeeren herumschwimmt.
  - Aber Wasserstoff wird von den Lebewesen auf der Erde mithilfe der Sonne erzeugt und im Organismus durch chemische Bindungen an der Flucht gehindert. Der Mensch besteht zum größten Teil aus Wasser, also verbranntem Wasserstoff. Aber aus Wasser kann man reinen Wasserstoff ziehen. So wie Ihr Aquavolta®  $H_2$  Inhalator & Infuser es kann.
  - Übrigens: Sie und ich bestehen zu 99% aus H-Atomen. Solange wir leben. Weil Wasserstoff so klein ist, dass er trotz seiner Überzahl viel weniger Platz in unserem Körper einnimmt.

In unserer Atmosphäre finden wir 21 % Sauerstoff, aber nur 0,00005 % Wasserstoff. Der Sauerstoff bleibt auf der Erde. Aber die Abwanderung von Wasserstoff aus der äußersten Schicht der Erdatmosphäre zum Weltraum beträgt knapp 50 Mio. Liter pro Tag oder gut 4,3 Tonnen. Das ist sozusagen der Wasserstoffpartialdruck der Erde. Nur durch die Aufrechterhaltung des Lebens auf unserem Planeten mit seinen wasserstoffproduzierenden und speichernden Organismen können wir diesen Verlust ausgleichen. Es sei denn, wir haben eine Technik, die uns hilft, den auf der Erdkruste noch vorhandenen Wasserstoff für unsere Zwecke freizusetzen. Diese Technik heißt Elektrolyse. Sie erfordert elektrischen Strom, der letztlich durch die aktuelle nachhaltige oder die prähistorische Nutzung von Sonnenenergie in Form von durch Lebewesen erzeugten fossilen Brennstoffen bereitgestellt wird. Die Elektrolyse gewinnt aus Wasser (verrostetem Wasserstoff) reinen Wasserstoff (und auch Sauerstoff) zurück.



William  
Henry


Wenn wir Wasserstoff wie beim Aquavolta® H<sub>2</sub> Inhalator in einer nicht entflammbaren und explosiven Konzentration von ca. 2 % einatmen, nehmen wir mit jedem Atemzug nachgewiesenermaßen einen Teil davon in den Blutkreislauf auf. Ein anderer Teil geht in die Nasenschleimhäute und über über den Riechnerv direkt ins Gehirn.

Etwas schwieriger ist es, den Wasserstoff in seiner Reinform als H<sub>2</sub> Gas in Wasser zu speichern, was die Aufgabe des Aquavolta® H<sub>2</sub> Infuser's ist. Dazu braucht es das Gesetz des zweiten wichtigen Henry auf diesem Gebiet, nämlich William Henry, ebenfalls ein genialer Engländer (1774 – 1836).

Gasförmiger Wasserstoff, um den es bei unserem Gerät geht, ist wasserscheu, weil er mit Wasser eigentlich nichts anfangen kann. Für ihn ist ein Aufenthalt im Wasser wie ein Friedhofsbesuch. Lauter Wasserstoffleichen liegen hier herum. Denn Wasser, H<sub>2</sub>O ist nichts als oxidiertes Wasserstoff, also verbrannt oder verrostet. Wie viel Wasserstoff trotzdem ins Wasser kann, hat uns William Henry gezeigt.

Mit dem Henry Gesetz muss auch unser Gerät leben: Das Henry-Gesetz besagt, dass der Partialdruck eines Gases über einer Flüssigkeit in einem konstanten Verhältnis („Henry Konstante“) zur Konzentration des Gases in der darunter liegenden Flüssigkeit steht. Die Löslichkeit von Gasen nimmt bei steigender Temperatur ab, aber bei steigendem Druck zu. Unter Normalbedingungen (25 °C, 1 Bar) kann man 0,8 mMol bzw. 1,6 mg/l Wasserstoff im Wasser lösen. Schon 0,5 mg/l haben Therapiewirkungen gezeigt!

Der Aquavolta® H<sub>2</sub> Infuser schafft dies viel schneller als alle anderen Geräte durch eine innovative Verwirbelungstechnik, die der Neigung von Wasserstoff entgegenwirkt, sich in Wasser rasch zu sehr großen Gasblasen zu vereinigen. Der aus dem Wasser austretende Wasserstoff wird durch den Hochgeschwindigkeitswirbel sofort wieder in das Wasser zurückgesaugt und zu kleinen Blasen vermischt.



## Inhalt



|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 5                                     | Technisch und optisch überlegen         |
| 6                                     | Zweckbestimmung                         |
| 7                                     | Lieferumfang                            |
| 8                                     | Zubehör des Generators                  |
| 9                                     | Inbetriebnahmeschritte 1 - 4            |
| 14                                    | Inhalationsvorbereitung                 |
| 15                                    | Die Atembrille                          |
| 16                                    | Inhalationsbetrieb                      |
| 17                                    | Wie wirkt die Inhalation im Körper      |
| 19                                    | Hintergrund Aquavolta                   |
| 20                                    | Der Betrieb als H <sub>2</sub> Infuser  |
| 21                                    | Aufbau des Infusers                     |
| 22                                    | Die Wirblerflasche                      |
| 23                                    | Auch andere Getränke sind möglich!      |
| 24                                    | Wartungs-Signale                        |
| 25                                    | Filterwechsel                           |
| 26                                    | Bitte beachten!                         |
| 27                                    | Sicherheitshinweise                     |
| 28                                    | PEM Zellen als Kerntechnologie          |
| 29                                    | Sicherheitstechnologie                  |
| 30                                    | Wirblertechnologie                      |
| 31                                    | Wasserstoff auf Nahrung übertragen      |
| 33                                    | Wie wirkt H <sub>2</sub> eigentlich?    |
| 35                                    | Wieviele Wasserstoff ist sinnvoll?      |
| 36                                    | Wie misst man Wasserstoff im Wasser?    |
| 37                                    | Garantie, Service und Technische Daten  |
| 39                                    | Rechtliches - Impressum                 |
| Buchteil für Fachkreise (nur als PDF) |                                         |
| 41                                    | Überblick Wasserstoffmedizin seit 2007  |
| 46                                    | Chronologie Wasserstoffmedizin bis 2019 |



# Überlegen



Wir mussten lange überlegen, wie wir unseren neuen Wasserstoff-Generator konzipieren. In Fernost gibt es ja bereits H<sub>2</sub> Verkaufsautomaten mit Münzschlitten. Wir wollten auch kein sehr großes und teures Gerät, das aussieht wie ein umgebauter Schweißapparat und nicht in ein anspruchsvolles häusliches oder berufliches Ambiente passt und eine Menge Lärm macht.



Von Anfang an war klar, dass wir kein Gerät wollten, das sogenanntes Brownsgas produziert, also ein Mischgas von Wasserstoff und Sauerstoff. Über dessen Wirkung gibt es noch keine wissenschaftlichen Studien, die uns wirklich überzeugt haben. Für uns galt: Standards statt Spekulationen! Daher kam für uns nur ein Gerät mit dem technisch reinsten Wasserstoff infrage, der heutzutage möglich ist: 99,995 %.



Ganz entscheidend war auch, dass die Menge des produzierten Wasserstoffs mit ca. 100 ml/Minute um mehr als das 10-fache höher liegt als bei einfachen PEM-Wasserstoffboostern, die zu Pseudo-Inhalatoren umgerüstet werden.

Den Ausschlag gab dann aber auch die Wirblertechnologie, die es ermöglicht, **gesättigtes Wasserstoffwasser 10 mal so schnell wie mit einem sehr guten PEM-Wasserstoffbooster** herzustellen, ohne dass das Wasser in direkten Kontakt mit Elektroden kommt.







## Zweckbestimmung

Der Wasserstoffgenerator produziert 100 ml reinstes Wasserstoffgas pro Minute und kann für zwei Funktionen verwendet werden

1. Herstellung wasserstoffreicher Getränke
2. Inhalation von Wasserstoff





# Lieferumfang

In dem größeren der beiden Pakete befindet sich der Wasserstoffgenerator mit dem Zubehör zur Inhalation.

In dem kleineren Paket befindet sich der Wasserstoff-Infuser (Wirbler) mit dem Zubehör zur Erzeugung von wasserstoffreichen Getränken.

Der Infuser funktioniert nur, wenn er an den Wasserstoffgenerator angeschlossen wird.






# Übersicht Wasserstoff-Generator



1. Schaltsensor
2. Fenster für Funktionskontrolle
3. Tankdeckel des Nachfülltanks für doppelt destilliertes Wasser
4. Wasserstoff-Auslaufstutzen mit Kappe
5. Ventil für O<sub>2</sub> Auslass
6. Verbindungsbuchse für H<sub>2</sub>-Wasserwirbler
7. Buchse für Netzstecker




# Zubehör des Wasserstoffgenerators



1. Nasenbrille
2. Netzkabel
3. Netzgerät
4. Verbindungskabel
5. Wassersammler
6. Wasserfilter

# Inbetriebnahme 1

1. Schrauben Sie den Wasser-Nachfülltank auf und füllen Sie destilliertes Wasser bis zu der mit dem Pfeil markierten Line ein.
2. Setzen Sie danach den Wasserfilter ein und drehen Sie den Deckel des Wassertanks wieder zu.
3. Verwenden Sie ein Wasser mit einer Leitfähigkeit  $< 5$  Mikrosiemens/cm<sup>2</sup> (bzw. 0,5 Ohm pro Meter oder 3,2 TDS ppm) um der Elektrolysezelle die volle Lebensdauer von 5000 Stunden zu erhalten. Am besten doppelt destilliertes Wasser (Aqua Bidest Laborwasser). Dann hält Ihre Zelle bei täglich 1-stündigem Betrieb über 13 Jahre!







# Inbetriebnahme 2

2. Stecken Sie den Adapter des Netzteils in die rechte untere Buchse und verbinden Sie den Netzstecker mit dem Netzteil und einer 220 Volt Steckdose.

Ein blaues Blinken am Schaltsensor zeigt, dass ein Test der Gerätefunktionen durchgeführt wird.





### Inbetriebnahme 3



3. Öffnen Sie den Klappdeckel über dem H<sub>2</sub> Ausgang.  
Anschließend öffnen Sie das O<sub>2</sub> Ventil, indem Sie es ein Stück nach oben ziehen.






Inbetriebnahme 4  
Sehr wichtig!  
Nicht abbrechen!

4. Schütteln Sie das Gerät nun 4-5 mal sanft hin und her, um noch vorhandene Luftblasen aus dem Gerät zu entfernen. Drücken Sie dann **5 Sekunden** lang den Sensorschalter um den Aktivierungsmodus zu starten.

Der **Aktivierungsprozess dauert 2 Stunden**. Währenddessen blinkt die blaue Sensorlampe. **Dabei muss das O<sub>2</sub> Ventil herausgezogen** sein. Dieser Prozess ist auch erforderlich, wenn das Gerät lange Zeit unbenutzt war.

## Inhalationsvorbereitung

1. Stecken Sie den gebogenen kurzen Schlauch des Wassersammlers in den geöffneten H<sub>2</sub> Ausgang.



2. Stecken Sie das Ende der Nasenbrille fest auf den zweiten Ausgang des Wassersammlers.



3. Ziehen Sie die Nasenbrille am Hinterkopf fest, wie rechts abgebildet.




# Die Atembrille



- Wasserstoffbrillen sind Verschleißartikel, die **mindestens einmal monatlich gewechselt** werden sollten.
- Jeder Nutzer braucht seine eigene Atembrille!
- Wie oft man die Brille wechseln sollte hängt auch von der Grunderkrankung und den weiteren Umständen ab.
- Bei akuten Erkältungen sollte die Nasenbrille zum Beispiel häufiger gewechselt werden.
- Für Allergiker und sensible Personen sind extraweiche Nasenbrillen aus Kraton erhältlich.




- Während Nasenbrillen aus der Sauerstofftherapie gut geeignet sind, ist von Headsets und Oxynasal-Brillen, die auch die alternative Atmung über den Mund ermöglichen, für die Wasserstoffinhalation ungeeignet, weil der Wasserstoff stets sofort nach oben strebt.






## Inhalationsbetrieb

Empfehlung: 30 Min.  
1 – 2 mal täglich



Ein kurzer Druck auf die Sensortaste startet die Wasserstoffabgabe an die Nasenbrille. Der Sensor leuchtet dabei blau. Zum Stoppen drücken Sie erneut. Nach zwei Stunden stoppt das Gerät automatisch. Sie können also **nebenbei arbeiten, fernsehen, Karten spielen und sogar schlafen**. Wenn zu wenig Wasser im Gerät ist, piept es und zeigt ein rotes LED-Licht. Dann ist es Zeit, doppelt destilliertes Wasser in den Wassertank nachzufüllen.




# Wasserstoff-Inhalation Verlauf (2012)

Eine grundlegende Studie zu molekularem Wasserstoff ( $H_2$ ) die Inhalation in akuten zerebralen Ischämie Patienten für Sicherheitsüberprüfung mit physiologischen Parametern und Messung von Blut  $H_2$  Pegel

Ono H, Nishijima Y, Adachi N, et al. A basic study on molecular hydrogen ( $H_2$ ) inhalation in acute cerebral ischemia patients for safety check with physiological parameters and measurement of blood  $H_2$  level. *Med Gas Res.* 2012;2(1):21. Published 2012 Aug 23. doi:10.1186/2045-9912-2-21

- In dieser Studie von 2012 wird der Verlauf einer 30-minütigen Wasserstoffinhalation mit seiner Auswirkung die Wasserstoffkonzentration (HC) im arteriellen (rot) und venösen (blau) Blut dargestellt.







# H<sub>2</sub> Inhalation und Zielorgane (2019)

## Wasserstoffgasverteilung in Organen nach Inhalation: Echtzeitüberwachung der Gewebewasserstoffkonzentration bei Ratten

Yamamoto R, Homma K, Suzuki S, Sano M, Sasaki J. Hydrogen gas distribution in organs after inhalation: Real-time monitoring of tissue hydrogen concentration in rat. Sci Rep. 2019;9(1):1255. Published 2019 Feb 4. doi:10.1038/s41598-018-38180-4

Bild unten links: Wasserstoffverteilungskurve nach der Inhalation von 3 % H<sub>2</sub> Atemluft bis zur Sättigung. Im Vergleich zu den anderen Organen stieg die Wasserstoffkonzentration im Oberschenkelmuskel allmählich an. Die Leber hatte die höchste C<sub>max</sub>, während die Niere die niedrigste hatte. Leber, n = 6, Gehirn, n = 8, Bauchfett, n = 4, Niere, n = 5, Oberschenkelmuskel, n = 5.


Bild unten rechts: Nach Beendigung der Inhalation kehrte die Wasserstoffkonzentration in jedem Organ zur Grundlinie zurück. Die Wasserstoffkonzentration im Oberschenkelmuskel nahm im Vergleich zu den anderen Organen allmählich ab, während die Konzentration im Gehirn, in der





# Hintergrund AquaVolta®

- Der Markenbegriff AquaVolta® setzt sich zusammen aus dem lateinischen Begriff für Wasser (**Aqua**) und dem Namen des Erfinders der Batterie, Alessandro **Volta**. Er steht für elektroaktiviertes Wasser.
- Das Kennzeichen von AquaVolta® ist, dass es eine negative elektrische Spannung gegenüber einer Messelektrode aufweist, ein sogenanntes **negatives Redoxpotential (ORP)**.
- Je niedriger das Redoxpotential, desto höher ist die Bereitschaft des Wassers, Elektronen abzugeben. Pro 0,018 Volt (18 Millivolt) niedrigerem Redoxpotential verdoppelt sich diese Bereitschaft. AquaVolta® hat ein um 400 bis 800 Millivolt niedrigeres Redoxpotential als Leitungswasser oder Mineralwasser aus der Flasche.
- Durch seine hohe Bereitschaft Elektronen abzugeben, wird AquaVolta® auch als **antioxidatives Wasser** bezeichnet. Es wird aber nicht nur von Ärzten zur Therapie eingesetzt, sondern etabliert sich auch aufgrund seines angenehmen Geschmacks als modernes Alltagsgetränk
- Als hauptverantwortlich für den Elektronenreichtum von AquaVolta® gilt der **Gehalt an gelöstem Wasserstoffgas (H<sub>2</sub>)**. Um diesen zu erhöhen, wurde der **AquaVolta® Hydrogen Infuser** entwickelt. Der Infuser kann aber nicht nur Wasser, sondern alle Getränke ohne Kohlensäure mit H<sub>2</sub> anreichern.




**AQUAVOLTA®**


# Der Betrieb als H<sub>2</sub> - Infuser



- Der spezifische Nutzen einer Aufnahme von Wasserstoff in den menschlichen Körper hängt nicht nur von der aufgenommenen Menge, sondern in einem ganz entscheidenden Maß vom Aufnahmeweg ab. Die beiden entscheidenden Aufnahmewege sind Wasser bzw. wässrige Lösungen und wasserstoffreiches Atemgas.
- In der wissenschaftlichen Diskussion sind seit 2007 das Trinken von Wasser, das mit Wasserstoff angereichert ist, die Inhalation von Wasserstoffgas, die Infusion und Injektion von wasserstoffreicher isotonischer Kochsalzlösung in die Blutbahn oder ins Gewebe, das äußerliche Besprühen von Haut, Augen, Ohrenkanälen mit wasserstoffreichen Lösungen sowie das Baden in wasserstoffreichem Wasser.
- Durch den Anschluss des H<sub>2</sub> Infusers an den Wasserstoffgenerator kann in einer derzeit unschlagbaren Geschwindigkeit Wasserstoffwasser mit der Vollsättigung von 1,6 mg/l erzeugt werden.
- Dieses Wasser kann wiederum zum direkten Trinken, zum Einlegen von Nahrungsmitteln, zur Herstellung von wasserstoffreichen Getränken und anderen Flüssigkeiten genutzt werden. Aufgrund der hohen Diffusionsfähigkeit von Wasserstoff kann es auch durch die sogenannte „kontaktlose Übertragung“ durch bestimmte Infusionsbeutel auf eine Infusions- oder Injektionslösung eine sogenannte „Hydrogen Saline“ erzeugt werden.



O<sub>2</sub>-Auslass muss bei Wirblerbetrieb immer offen sein!



## Kurzanleitung Infuser-Betrieb:


1. Getränk exakt bis zur 400 ml Marke einfüllen.
2. Deckel festdrehen und H<sub>2</sub> Eingangsbuchse freigeben.
3. H<sub>2</sub> Eingangsbuchse mit dem H<sub>2</sub> Ausgang des Inhalators verbinden
4. Stromverbindung zum Inhalator herstellen.
5. Wasserstoffgenerator mit Sensortaste starten.
6. Sobald Blasen im Wirbler aufsteigen, mit dem Ein/Aus-Schalter Verwirbelung starten.
7. Der Wirbler stoppt nach 90 Sekunden. Wasser ist dann vollgesättigt mit Wasserstoff.
8. Andere Getränke: Stoppen Sie den Wirbler nach 10 bis 30 Sekunden mit dem Ein/Ausschalter. Heißgetränke bis 60 Grad C können bis zu 60 Sekunden verwirbelt werden.

## Die Wirblerflasche






# Der Wasserstoff-Infuser (Wirblerflasche)



Das Wasser oder das sonstige gewünschte kohlensäurefreie Getränk (Tee, Saft, Milch etc.) wird exakt bis zur 400 ml Marke (1) in die Wirblerflasche gefüllt. Der Deckel des Wirblers wird in die angezeigte Position (2) gedreht. Dann wird der Wirbler mittels des kurzen Schlauches (3) aus dem Wirblerzubehör mit dem Wasserstoffgenerator verbunden. **Der Sauerstoffauslass muss immer geöffnet sein!**



Der Strom für den Wirbler wird über das Verbindungskabel vom Wasserstoffgenerator zugeführt. Achtung: Die Stecker (4) (5) sind empfindlich und dürfen nur mit dem weißen Pfeil nach oben eingesteckt werden. Zuerst wird der Wasserstoffgenerator über die Sensortaste (6) gestartet. Dabei muss der Sauerstoffauslass (7) geöffnet sein. Danach erst der Wirbler über dessen Starttaste (8). Die Produktion (9) stoppt nach 90 Sekunden. Falls Sie andere Getränke als Wasser mit Wasserstoff besprudelt haben, reinigen Sie die Flasche sofort nach Gebrauch mit Wasser unter 60° C und mildem Spülmittel. Dabei bitte gut schütteln und mit klarem Wasser nachspülen.


# Nicht nur Wasser!

Klassische Wasserstoffwasser-Geräte wie die verbreiteten Wasserstoffbooster unterziehen das Wasser einer Elektrolyse, um Wasserstoffgas aus dem Wasser zu ziehen und das Wasser mit dem beliebten Gas anzureichern. Die Elektrolyse schließt aber andere Getränke als Wasser aus, weil durch den direkten Kontakt mit den Elektroden bei Säften, Tees, Milch, Kaffee oder ähnlichem unerwünschte chemische Reaktionen und Nebenprodukte auftreten können. Keine Gute Idee! Daher ist in Wasserstoffboostern oder Wasserionisierern nur der Betrieb mit Wasser sinnvoll und alles andere strengstens verboten.


Beim Aquavolta® Hydrogen Infuser dagegen wird der Wasserstoff aus reinstem Laborwasser mit einer Reinheit von fast 100 % gewonnen. Die mit Wasserstoff aufgewirbelte Flüssigkeit im Infuser hat also keinerlei Elektrodenkontakt und **es finden keine unerwünschten chemischen Reaktionen statt**. So öffnet sich die Wasserstoffwelt auch für Menschen, die nicht gerne nur Wasser Trinken. Nicht erlaubt sind lediglich kohlenensäurehaltige Getränke.




# Wartungs-Signale



- **Wasserstandswarnung:** Die LED leuchtet permanent rot und ein Piepston ertönt. Bitte füllen Sie den Tank mit doppelt destilliertem Wasser nach.





- **Wasser in der Zuleitung zur Nasenbrille oder zum Wirbler:** Die LED flackert rot und ein Piepston ertönt.
- Drücken Sie kurz die Sensortaste, um das Blinken abzuschalten und trocknen Sie die Nasenbrille. Gegebenenfalls ersetzen Sie die Nasenbrille durch eine neue.
- Falls sich mehr Wasser als markiert im Wasserbehälter angesammelt hat als markiert, entleeren Sie diesen.





# Filterwechsel

- Wenn die LED blau blinkt muss der Filter gewechselt werden.
- Schalten Sie zuerst das Gerät am Schaltsensor aus.
- Schrauben Sie den Deckel des Wassertanks auf und ersetzen Sie den herausnehmbaren Filter
- Schrauben Sie den Wassertankdeckel wieder ein und Drücken Sie kurz die Sensortaste. Das blaue Licht hört nach einem Piepston auf zu blinken.





# Bitte beachten

01. Bitte benutzen Sie nur Originalfilter zum Austausch.
02. Füllen Sie ausschließlich doppelt destilliertes Wasser (Laborwasser) in den Tank.
03. Die Nasenkanüle darf nicht länger als 1 Monat von derselben Person genutzt werden und muss spätestens dann ersetzt werden.
04. Während des Betriebs kann sich an der Nasenbrille Dampf oder Kondensat absondern. Bitte einfach ausschütteln.
05. Die Nasenbrille nie direkt am Gerät anstecken, sondern immer den Wassersammler zwischen Gerät und Maschine einfügen. Sonst könnte Wasser in Ihre Atemwege kommen.
06. Das korrekte Arbeiten des Geräts erkennen Sie daran, dass in dem Sichtfenster Gasblasen aufsteigen. Die maximale Wasserstoffproduktion beginnt nach ca. 5 Minuten.
08. Wenn Sie das Gerät über weite Strecken transportieren wollen, vergessen Sie bitte nicht, den Klappverschluss des  $H_2$  – Ausgangs und den Sauerstoffausgang fest zu verschließen, damit beim Transport kein Wasser austreten kann.
09. Wir empfehlen, das Gerät mindestens einmal am Tag zu benutzen. Sollten Sie es länger als 2 Wochen nicht benutzen wollen, haben, sollten Sie das Wasser aus dem Tank schütten. Vor einer Wiedereinbetriebnahme ist dann die zweistündige Aktivierung durchzuführen.
10. Der Aktivierungsprozess ist auch dann durchzuführen, wenn Sie den Eindruck haben, dass zu wenige Blasen im Sichtfenster aufsteigen.
11. Wenn Sie beim Nachfüllen des doppelt destillierten Wassers zu viel einfüllen (Höher als markiert), kann das Wasser durch die Auslässe herausspritzen. Entfernen Sie dann das überschüssige Wasser bis zur Markierung








# Sicherheitshinweise



01. Vor dem Einschalten muss das Ventil für den O<sub>2</sub> Auslass nach oben gezogen sein.
02. Benutzen Sie das Gerät nur in einem gelüfteten Raum und halten Sie Hitze von ihm fern.
03. Achten Sie auf festen Sitz der Stromstecker.
04. Das Gerät muss horizontal stehen. Ansonsten könnte der Umkippschutz-Sensor eine Zwangsabschaltung herbeiführen.
05. Falls das Gerät überhitzt wird, erfolgt eine automatische Selbstabschaltung. Dabei blinkt abwechselnd eine rote und blaue LED im Sichtfenster. Drücken Sie dann kurz auf den Schaltsensor zum Ausschalten der LEDs und warten Sie mit dem Neustart, bis das Gerät abgekühlt ist.
06. Bei Überfüllung des Tanks entfernen Sie bitte das überschüssige Wasser. Achten Sie beim Abwischen des Geräts, dass sich insbesondere auf dem Lüftungsgitter auf der Rückseite keine Wassertropfen befinden dürfen.
07. Beim Auftreten von Störungen schaltet sich das Gerät immer automatisch ab. Achten Sie auf die angezeigten LEDs und die Hinweise dazu in dieser Anleitung. Wenn das Gerät trotz korrekter Vorgehensweise nicht wieder startet, verständigen Sie bitte den Servicebeauftragten Ihres Händlers. Sie dürfen das Gerät unter keinen Umständen selbst öffnen.
08. Kinder und Personen mit Bewusstseinsstörungen dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt durch eine Person bedienen, die mit der Bedienungsanleitung vertraut ist.
09. Wenn Sie sich beim oder nach dem Gebrauch des Produkts unwohl fühlen, dürfen Sie es nicht weiter benutzen.
10. Der Gebrauch von offenem Feuer in dem Raum, in dem Sie es benutzen, ist untersagt. Lüften Sie den Raum vor jeder Nutzung des Inhalators.



# Kerntechnologie: PEM Elektrolyse






## Sicherheitstechnologie: Drucksensor

---


Schon bei der geringsten Gefahr, dass zu viel Wasserstoff austritt, schaltet der Generator sofort automatisch ab. Wenn die Nasenbrille blockiert oder wenn Sie nur ein kleines bisschen zu viel Wasser in den Infuser geben, stoppt die Wasserstoffproduktion, bis der Bedienfehler beseitigt ist. Dies ermöglicht der Druck-Controller im Inneren.





# Der Wirbler für perfekte H<sub>2</sub>-Galenik

- Galenik ist der Fachbegriff für die Kunst der Arzneimittelherstellung. Obwohl Wasserstoff ein natürliches Gas in unserem Körper und kein Arzneimittel ist, wird er doch in vielen Medizinischen Bereichen wie ein Medikament eingesetzt.
- Die einzigartige kavitationsfördernde Hochgeschwindigkeits-Wirbeltechnik des Infusers und eine raffinierte Form der Schaufeln sorgt dafür, dass sich der Wasserstoff viel schneller in der Flüssigkeit aufsättigt als bei anderen Techniken.
- Der Wasserstoff wird durch einen tornadoartigen Wirbel in das Wasser gezogen, große Blasen werden dabei zu Mikrobubbles reduziert.







# Wasserstoff übertragen!

Wenn Wasserstoff in Wasser gelöst ist, kann er leicht in Lebensmittel eindringen und deren Oxidationsprozesse durch Lagerung und Transport verhindern und sogar rückgängig machen.


Dabei werden die in ein solches Wasser eingelegten Lebensmittel elektronenreicher, wie man an einem deutlich niedrigeren Redoxpotential messen kann.

Eine Senkung des Redoxpotentials (ORP) gilt in der Lebensmittelanalytik als Qualitäts- und Frischefaktor. Hier das Beispiel von zwei Hälften einer Tomate. Die obere Hälfte wurde in Wasserstoffwasser aus dem H<sub>2</sub>-Infusor für 15 Minuten eingelegt. Die untere nicht.

Der Gewinn beträgt 0,51 Volt!

# Wasserstoffwasser– Nicht nur trinken!

- Legen Sie Früchte, Salate, Schnittblumen, rohe Eier, Fisch, Fleisch und Gemüse für 15-30 Minuten in frisches Wasserstoffwasser ein. Derartige Nahrungsmittel erfrischen sich durch die Aufnahme von Wasserstoff, der sogar durch Eierschalen geht. Durch das Eindringen von Wasserstoff sinkt das Redox-potential des Lebensmittels, was zum Beispiel der Lebensmittelprüfer Prof. Dr. Manfred Hoffmann für ein Zeichen höherer Lebensmittelqualität hält. Rühren Sie Milchpulver, Diätpulver, Fitnesspulver etc. mit Wasserstoffwasser an. Lösen Sie Mineralien- und Vitaminmischungen darin auf. Auch dabei sinkt das Redoxpotential in günstiger Weise durch die Rolle von gelöstem Wasserstoff.
- Kaufen Sie sich Saftkonzentrate – möglichst mit BIO-Siegel. Damit machen Sie Schluss mit Schleppen und Umweltverschmutzung durch Getränkeverpackungen. Kein Hersteller auf dem Markt kann bisher Säfte mit besserem Redoxpotential liefern. Siehe: Asenbaum, K. H., Elektroaktiviertes Wasser, München 2016, S. 42 ff.
- Mixen Sie alkoholische Drinks und Cocktails mit Wasserstoffwasser. Sie werden milder, der Geschmack kommt besser zur Geltung. Machen Sie sich Eiswürfel aus Wasserstoffwasser.
- Nach Alkoholgenuss trinken Sie 2 Gläser am Abend sowie 2 Gläser am nächsten Morgen auf nüchternen Magen.
- Geben Sie Ihren Haustieren (Hunden, Katzen ...) wasserstoffreiches Wasser zu trinken und beobachten Sie, wie sich das Fell und die allgemeine Gesundheit positiv verändert.





# Wie wirkt H<sub>2</sub> als therapeutisches Gas gegen oxidativen Stress?



Das weiß die Wissenschaft tatsächlich auch 2019 noch nicht in allen Details. Man kennt aber weitgehend die Folgen des H<sub>2</sub> - Einsatzes aus Grundlagenstudien. Und eine Milliarden-Industrie in Fernost hat bereits dafür gesorgt, dass die Menschen nicht abwarten, bis Jahrzehnte dauernde Studien am Menschen zu 100 % die Wirksamkeit nachweisen. Sie verlassen sich bereits auf das, was wahrscheinlich dabei herauskommen wird.



Aus heutiger Sicht ist H<sub>2</sub> als therapeutisches Gas **das interessanteste von allen medizinischen Gasen**. Es **Wesentlichen verringert oxidativen Stress und Entzündungen, und damit die Ursache von über 150 der häufigsten Krankheitsbilder**. Oxidativer Stress und Entzündung sind aber zweifellos zwei der grundlegendsten Mechanismen zur Zerstörung der menschlichen Gesundheit vor allem beim zunehmenden Alter der Menschen und deren typischen Alterskrankheiten. Es hat sich gezeigt, dass molekularer Wasserstoff im Wesentlichen **in jedem Organ des menschlichen Körpers wirksam** ist, weil er den Bereich von oxidativem Stress und Entzündungen zu mildern hilft.



Weniger Hydroxylradikale, was heißt das? Wenn Sie sich die anderen freien Radikale ansehen, etwa Stickstoffmonoxid (NO): Dies ist ein sehr förderliches wichtiges freies Radikal, weil es die Blutgefäße erweitern kann und damit den Blutdruck verringern hilft. Niemand möchte NO durch ein Antioxidans neutralisieren! Daneben verwendet unser Immunsystem andere Oxidantien wie Wasserstoffperoxid, die alle nicht weggeputzt werden dürfen, wenn sie nicht überschießen. Aber für deren Bändigung sorgen bereits unsere körpereigenen Antioxidantien sehr zuverlässig. Und für die wirklichen Bio-Terroristen haben wir den Wasserstoff!

# Wie wirkt H<sub>2</sub> gegen nitrosativen Stress?



Auch das sehr zellschädigende Peroxynitrit-Anion geht durch eine Behandlung mit Wasserstoffgas offensichtlich zurück. Muss man warten, bis auch der letzte Mediziner weiß, warum das so ist? Der Arzt, der Sie behandelt, hat im Durchschnitt vor 20 Jahren Medizin studiert und hat in seiner Ausbildung oder Weiterbildung möglicherweise noch nie von den Mechanismen von Stickstoffmonoxid (NO) oder nitrosativem Stress durch Peroxynitrit Anionen erfahren.



Normale körpereigene Antioxidantien oder von außen zugeführtes Vitamin C sind nicht selektiv. Sie geben ihre Elektronen schon an vergleichsweise schwache Oxidantien ab. Molekularer Wasserstoff dagegen reagiert nur selektiv auf superstarke Oxidantien, die von anderen körpereigenen Antioxidantien nicht bewältigt werden können.



Wasserstoff hilft, alles wieder in die Homöostase zu bringen. Dies ist der Grund, warum Wasserstoff so schwer zu untersuchen ist, weil, wenn Sie einer Zelle oder einem Tier molekularen Wasserstoff verabreichen, oftmals keine Veränderungen sichtbar werden. Wenn alles bereits perfekt ist, ist alles bereits in der Homöostase, sehen Sie keine Veränderungen. Zur Messung der Wirkung von Wasserstoff muss man häufig eine Art Toxin verabreichen, um zu sehen, wie Wasserstoff durch diese Toxine hervorgerufene Problem mindert, rettet oder abschwächt.



# Wie viel Wasserstoff ist nützlich?

Zunächst: **Ein Zuviel gibt es nicht.** Nicht benötigter, also überschüssiger Wasserstoff, wird wenige Minuten nach der Aufnahme wieder ausgeschieden, vor allem durch die Atmung.

1. Beim **Trinken** von wasserstoffgesättigtem Wasser (1,6 mg H<sub>2</sub>/Liter) ist die Menge des aufgenommenen Wasserstoffgases natürlicherweise begrenzt durch die Menge an Wasser, die man täglich trinkt, also zwischen 1 und 3 Litern. Als therapeutisches Maß hat sich dabei bei den führenden Wissenschaftlern eine Mindestmenge von 3 mg am Tag etabliert. 1 mg Wasserstoff entspricht bei atmosphärischem Standarddruck 11,1 ml. Also enthält ein Liter gesättigtes Wasserstoffwasser 17,8 ml gelöstes H<sub>2</sub> Gas.
2. Die **Inhalationsfunktion** des AquaVolta® H<sub>2</sub> Inhalators bietet 100 ml reinstes Wasserstoffgas pro Minute an, die etwa 9 mg Wasserstoff entsprechen. Da ein Atemzug zu einem Drittel aus Einatmen, zu einem Drittel aus einer Atempause und zu einem weiteren Drittel aus Ausatmen besteht, wäre schon nach einer Minute Inhalation das als therapeutisch angesehene Maß von 3 mg am Tag erreicht. Aber der Wasserstoff wird ebensowenig wie andere Gase zu 100 Prozent aus dem Atemvolumen gezogen. Der Hersteller des AquaVolta® H<sub>2</sub> Inhalators empfiehlt daher zur Erzielung der besten Ergebnisse eine Inhalationszeit von 30 Minuten.

Ein wesentlicher **Unterschied zwischen der Inhalation und dem Trinken von Wasserstoffwasser** besteht in den unterschiedlichen Aufnahmewegen.


- Beim **Trinken** wird der Großteil des Wasserstoffs zusammen mit dem Wasser vom **Dünndarm** über Blut und Zwischenzellflüssigkeit in den Körper eingeschleust. Bei diesem Vorgang steht die Lunge am Ende des Wasserstoffkreislaufs durch den Körper und scheidet den Wasserstoff, der nicht unterwegs verbraucht wurde, durch Ausatmung wieder aus.
- Beim **Inhalieren** steht die Nasenhöhle mit dem **Riechnerv und seiner direkten Verbindung zum Gehirn** am Anfang des Wasserstoffkreislaufs. Ebenso wichtig ist die **Bronchialpassage**, bevor das **Blut** den Wasserstoff aufnimmt und primär an **Leber, Herz und Gehirn** weiter gibt.

Beide Methoden der Wasserstoffaufnahme ergänzen sich also in idealer Weise.



| mg H <sub>2</sub>    | ml H <sub>2</sub>    |
|----------------------|----------------------|
| 0,091                | 1                    |
| 0,9                  | 10                   |
| 1                    | 11,1                 |
| 1,6                  | 17,8                 |
| <b>3</b>             | <b>33,3</b>          |
| 9                    | 100                  |
| 100                  | 1.110                |
| Gramm H <sub>2</sub> | Liter H <sub>2</sub> |
| 0,09                 | 1                    |
| 1                    | 11,1                 |
| 100                  | 1.110                |
| 1.000                | 11.100               |

# Wasserstoff Messtropfen



Der Test des Gehalts an molekularem Wasserstoff mit dem optional erhältlichen H<sub>2</sub> blue® Kit wird unmittelbar nach der Produktion durchgeführt. Dazu füllt man vorsichtig eine Wasserprobe von 6 ml in den Messbecher und gibt einen Tropfen der blauen Messflüssigkeit dazu. Jeder Tropfen, der sich entfärbt, bedeutet 0,1 ppm (=100 ppb) gelöstes Wasserstoffgas. Wenn sich ein Tropfen nicht mehr von selbst entfärbt, darf man sanft umrühren. Wenn die Flüssigkeit sich dann immer noch nicht entfärbt, zählt der letzte ins Wasser gegebene Tropfen noch dazu. Wasser unter normalem Luftdruck kann bis zu 1,6 mg/l (ppm) Wasserstoffgas (Vollsättigung) enthalten. Mit dem **AquaVolta® Wasserstoff Booster** kann man auch ein übersättigtes Wasser herstellen mit über 6 ppm. Diese fällt aber binnen weniger Minuten auf die Vollsättigung zurück, wenn die Probe Kontakt mit der normalen Atmosphäre bekommt. Wer viel Wasserstoff will, muss schnell trinken.

Die Testflüssigkeit nicht trinken und von Kindern fernhalten! Benutzen Sie Schutzhandschuhe, einen abwischbaren Untergrund und achten Sie auf Textilien. Die Tropfen enthalten Methylenblau, einen sehr intensiven Farbstoff.



# Service und Garantie



Zuständig und Ansprechpartner für Garantieleistungen ist Ihr Händler. Dies gilt insbesondere für Zusagen, welche die zweijährige gesetzliche Gewährleistung übertreffen. Sämtliche Garantiezusagen werden daher auf dem Kaufbeleg (Rechnung) Ihres Händlers aufgeführt.

Hersteller (Generalimporteur und Servicezentrum):

Aquacentrum, Inh. Yasin Akgün

Münchener Str. 4A – 85748 Garching bei München

[www.aquacentrum.de](http://www.aquacentrum.de)

Aquavolta® ist eine vom Deutschen Patent- und Markenamt geschützte Wortmarke (Nr. 30 2015 207 850). Markeninhaber: Karl Heinz Asenbaum, Constanze Asenbaum.

## EG-Konformitätserklärung



Fa. Aquacentrum  
Inh. Dipl. Ing. TU München Yasin Akgün  
Fraunhoferstraße 13  
80469 München

erklärt hiermit, dass folgendes Produkt:

Produktbezeichnung: AquaVolta Hydrogen Infuser & H2 Inhalator  
Wasserstoffgenerator + Wirbler zur  
Typenbezeichnung: Herstellung von pH-neutralem  
Baujahr: Wasserstoffwasser  
ab 2018

allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien **Elektrische Betriebsmittel (2006/95/EG)** und **Elektromagnetische Verträglichkeit (2006/42/EG)** entspricht.

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

DIN EN 55014-1:2000+A1+A2:2002  
DIN EN 55014-2:1997+A1:2001  
DIN EN 61000-3-2:2006  
DIN EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005  
DIN EN 61335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006  
DIN EN 61000-3-2:2006  
DIN EN 50366:2003+ A1:2006

München,  
01.12.2018



Dipl. Ing. (TU München) Yasin Akgün  
Inhaber Aquacentrum



# Technische Daten

## AQUAVOLTA®

### Wasserstoff Infuser & H<sub>2</sub> – Inhalator



- Wasserstoffleistung: 100 ml/Minute (+/- 10 %)
- Wasserstoffreinheit (zertifiziert): > 99,995 %
- Betriebswasser: Doppelt destilliertes (Bidestilliertes) Wasser oder Laborwasser. < 5 µs/cm
- Eingangsspannung des externen Netzteils: Wechselstrom 100-240 V /50 – 60 Hz
- Stromverbrauch: < 60 W
- Maße des Wasserstoff-Generators (L x B x H): 130 x 120 x 203 mm
- Gewicht des Wasserstoff-Generators (ungefüllt): 900 g
- Maße der Wasserstoff-Infuser-Flasche: (L x B x H): 77 x 77 x 210 mm
- Füllmenge der Wasserstoff-Infuser-Flasche: 0,4 L
- Leergewicht der Wasserstoff-Infuser-Flasche: 390 g
- Stromversorgung der Wasserstoff-Infuser-Flasche: 12 V

# Rechtliches und Impressum



Ein Handbuch der Aquavolta UG (haftungsbeschränkt). 80798 München. Georgenstr. 110.  
Autor und Copyright: Karl Heinz Asenbaum. Email: [aquavolta@email.de](mailto:aquavolta@email.de)

## WICHTIGE HINWEISE

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen. Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vollständig und gegebenenfalls mehrmals durch. Werfen Sie sie nicht weg, damit Sie gegebenenfalls wieder nachsehen können! Sie dürfen und sollen auch Rückfragen stellen. Kontaktadresse siehe oben. Für unsachgemäße Installation, Handhabung und Betrieb wird keine Verantwortung übernommen.

## HAFTUNGSAUSCHLUSS

Molekularer Wasserstoff ist ein im menschlichen Körper natürlich und kontinuierlich vorkommendes Gas, das unter anderem durch eine gesunde Darmflora erzeugt wird. Risiken und Nebenwirkungen durch den Genuss von wasserstoffreichem Wasser sind in der bisherigen wissenschaftlichen Literatur nicht bekannt. Dennoch übernehmen wir keine Haftung für medizinische Aussagen und Artikel über die Wirkung von ionisiertem Wasser, Wasserstoffwasser, und/oder Elektrolytwasser.

Autor, Verlag und Hersteller haften nicht für Entscheidungen oder Verhaltensweisen, die jemand aus den in dieser Publikation getroffenen Aussagen für seine Gesundheit zieht. Sie sollten diese Publikation niemals als alleinige Quelle für gesundheitsbezogene Maßnahmen verwenden. Bei gesundheitlichen Beschwerden sollten Sie auf jeden Fall Rat von einem zugelassenen Arzt oder Therapeuten einholen.

Weiter führende Literatur finden Sie auf der Website [www.euromultimedia.de](http://www.euromultimedia.de)



# AQUAVOLTA<sup>®</sup>

## H<sub>2</sub> Technology



- Die ideale Kombination von H<sub>2</sub> Inhalation und wasserstoffreichem Wasser, sogar für andere Getränke als Wasser.
- 100 ml/Minute pure H<sub>2</sub> Leistung
- Zuführung über bequeme Nasenbrille ohne Atemmaske
- Kein Knallgas- oder Brownsgas! Reines H<sub>2</sub> mit 99,995 %.
- 0,4 Liter vollgesättigtes H<sub>2</sub> Wasser in 90 Sekunden.



- Der zweite Teil dieses Handbuchs ist für Fachkreise bestimmt und in stets aktueller Form als PDF erhältlich. Mit dem Download bestätigen Sie, dass Sie einem medizinischen Fachkreis angehören.
- Downloadlink:  
[http://www.aquavolta.de/euromultimedia/pdf/studien\\_deutsch.pdf](http://www.aquavolta.de/euromultimedia/pdf/studien_deutsch.pdf)
- Der QR Code führt ebenfalls zur Fachausgabe des Handbuchs.




# Wasserstoffmedizin seit 2007

Der AquaVolta® Hydrogen Infuser und H<sub>2</sub> Inhalator ist in erster Linie ein Gerät für therapeutische Fachleute. Falls Sie ein medizinischer Laie sind, beachten Sie bitte, dass wir hier keine medizinischen Ansprüche geltend machen, indem wir Ihnen von der existierenden Forschung berichten. Die Fakten in diesem Teil des Handbuchs zeigen die wichtigsten Forschungsergebnisse zum Thema Wasserstoffgas in Bezug auf die Gesundheit und verweisen auf wissenschaftliche Studien für therapeutische Fachkreise, die meist in englischer Sprache vorliegen, da dies heutzutage die Sprache der internationalen Medizin ist. Eine Zusammenfassung der wissenschaftlichen Forschungsgebiete zu diesem Thema sehen Sie in einer umfassenden Übersichtsarbeit des Nobelpreis-Kandidaten Garth R. Nicolson in der Grafik rechts. Über den QR-Code darunter können sie die ganze Arbeit lesen.


Seit eine [bedeutende medizinische Publikation im Jahr 2007 molekularen Wasserstoff als selektives Antioxidans](#) nachgewiesen hat, dass die gravierenden Schäden durch das Hydroxylradikal verhindern kann, haben sich mehr als 2000 Wissenschaftler mit dessen medizinischer Erforschung befasst.

Es geht dabei um über 150 Krankheitsbilder, von denen man ausgeht, dass H<sub>2</sub> als neues therapeutisches Gas diese positiv beeinflussen könnte. Antioxidantien in Wasserstoffwasser haben bisher über 150 Krankheiten positiv beeinflusst, verbessert oder sogar rückgängig gemacht.

Die gerade entstehende Wasserstoffmedizin arbeitet mit 3 Verfahren, wie man das therapeutische Wasserstoffgas in den Körper einschleusen kann.:



1. **Wasserstoff oral:** Durch das Trinken von Wasser, das erheblich mit Wasserstoffgas angereichert ist. Normales Trinkwasser enthält praktisch keinen Wasserstoff. Seltene Heilquellen enthalten weniger als 0,1 mg/l Wasserstoff. Wasserstoffwasser für therapeutische Zwecke enthält mindestens 0,5 mg/l gelöstes Wasserstoffgas.
2. **Wasserstoff-Infusion:** Dabei wird isotonische wasserstoffreiche Kochsalzlösung in die Venen infundiert.
3. **Wasserstoff-Inhalation:** Dabei wird H<sub>2</sub> Gas in einem nicht entflammbaren oder explosiven Prozentsatz der Atemluft beigemischt, um viel größere Mengen als beim Trinken in den Kreislauf einzuschleusen.
4. **Bäder in wasserstoffreichem Wasser.**



Grafik: Shigeo Ohta, Molekularer Wasserstoff als präventives und therapeutisches medizinisches Gas: Initiierung, Entwicklung und Potenzial der Wasserstoffmedizin, 2014.

<https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2014.04.006>

1. Antioxidative Mechanismen gegen Hydroxylradikale und Peroxynitrit Anionen. Dadurch verringern sich oxidative Schäden, Lipidperoxide und Genmutationen. Schäden durch Stickstoffdioxid werden verringert.
2. Noch unklarer Mechanismus für Hochregulation von Nrf2, Ghrelin und FGF21 sowie Verringerung von oxidativem Stress. Entzündungszytokinen sowie die Anregung von GHRELIN und FGF21.

Grafik unten: [Nakayama M, Kabayama S, Ito S, Das Wasserstoffmolekül als antioxidative Therapie: klinische Anwendung in der Hämodialyse und Perspektiven, Renal Replacement Therapy 2016](#)




# Modellvorstellung der Wasserstoffwirkung (2017)

## Molekularer Wasserstoff: ein vorbeugendes und therapeutisches medizinisches Gas für verschiedene Krankheiten

Ge L, Yang M, Yang NN, Yin XX, Song WG. Molecular hydrogen: a preventive and therapeutic medical gas for various diseases. *Oncotarget*. 2017;8(60):102653-102673. Published 2017 Sep 21. doi:10.18632/oncotarget.21130

„H<sub>2</sub> hat selektive antioxidative, entzündungshemmende und apoptotische Eigenschaften. Exogene Schäden aufgrund von Faktoren wie Bestrahlung induzieren eine übermäßige zelluläre ROS-Produktion. H<sub>2</sub> dringt in Biomembranen ein und erreicht effektiv Zellkerne. H<sub>2</sub> fängt selektiv  $\cdot\text{OH}$  und ONOO ab und verhindert somit DNA Schäden. H<sub>2</sub> reguliert auch die Expression proinflammatorischer und inflammatorischer Cytokine wie IL-1 $\beta$ , IL-6, TNF- $\alpha$ , ICAM-1 und HMGB-1 und proapoptotischer Faktoren wie Caspase-3 herunter. Caspase-12, Caspase-8 und Bax. H<sub>2</sub> reguliert die Expression von anti-apoptotischen Faktoren wie Bcl-2 und Bcl-xL. ( B ) H<sub>2</sub> moduliert die Signaltransduktion innerhalb und zwischen vielen Pfaden. Die genauen Ziele und molekularen Mechanismen von H<sub>2</sub> sind unbekannt: Tritt bei verschiedenen Signalwegen ein Übersprechen auf? Wenn ja, wie wird es ausgelöst? Weitere Studien sollten andere Signalwege untersuchen “





„Durch Quantifizierung der im Tierversuch verabreichten Menge an  $H_2$  ist es möglich, über die für biologische Wirkungen in vivo erforderliche  $H_2$ -Dosis zu spekulieren. Aus Studien unter Verwendung von  $H_2$ -angereichertem Trinkwasser (0,3 bis 0,6 mM  $H_2$ ), eine wirksame  $H_2$  Dosis kann grob als das Produkt von  $H_2$  Konzentration und Menge der täglichen Wasserzufuhr. Bei einem Modell mit 200-g-Tieren und 20 ml angereicherter Wasserzufuhr pro Tag wäre die aufgenommene  $H_2$   $3-6 \times 10^{-5}$  mmol / g / Tag, was 1,8 bis 3,6 mmol / Tag bei einem Durchschnittsgewicht (60 kg) des Menschen entspricht; daher kann dies die Dosis sein, die erforderlich ist, um biologische Wirkungen im klinischen Umfeld zu erzielen. In Übereinstimmung mit diesen Spekulationen wurde berichtet, dass das Trinken von 1,5 l  $H_2$ -angereichertem Wasser (ungefähr 0,6 mM) täglich für 8 Wochen (d. H. 0,9 mmol  $H_2$  pro Tag) das oxidative Produkt im Urin (Malondialdehyd) reduzierte und das Antioxidationsmittel erhöhte (Superoxiddismutase) bei Probanden mit metabolischem Syndrom.... Dementsprechend wird angenommen, dass zumindest diese Dosierung erforderlich sein kann, um eine klinische Wirkung beim Menschen hervorzurufen.“

- 0,8 mM = 1,6 mg/l

Die Frage der Wasserstoff-Dosis

0,8 mM = 1,6 mg/l

# Fach-Videos

- Interview mit Tyler Le Baron (2017):

<https://www.aquacentrum.de/hydrogen-water-tyler-le-baron-munich-karl-heinz-asenbaum/>



- Interview mit Shigeo Ohta (2017):

[https://www.youtube.com/watch?v=hOqxANl-pRM&index=1&list=PLS2\\_rQEROX8MycX4VrgY59rdINGSQFIXg](https://www.youtube.com/watch?v=hOqxANl-pRM&index=1&list=PLS2_rQEROX8MycX4VrgY59rdINGSQFIXg)



- Gesamte Video Playlist Karl Heinz Asenbaum:

[https://www.youtube.com/playlist?list=PLS2\\_rQEROX8MycX4VrgY59rdINGSQFIXg](https://www.youtube.com/playlist?list=PLS2_rQEROX8MycX4VrgY59rdINGSQFIXg)




# 2009 H<sub>2</sub>-Wasser und Milch

## Atemwasserstoff, der durch Einnahme von handelsüblichem Wasserstoffwasser und Milch erzeugt wird

Shimouchi A, Nase K, Yamaguchi M, Ishiguro H, Kondo T. Atemwasserstoff, der durch Einnahme von handelsüblichem Wasserstoffwasser und Milch erzeugt wird. Biomark Insights . 2009; 4: 27-32. Veröffentlicht 2009 9. Februar

- Untersucht wurden 5 japanische Probanden mit Laktosemangel. „Etwa 70% der Weltbevölkerung hat hypolactasia <sup>23</sup> und etwa 90% der japanischen Erwachsenen sind Laktase-Mangel. <sup>18</sup>
- „Es ist allgemein anerkannt, dass Atemwasserstoff die Kohlenhydratgärung im Dickdarm reflektiert. <sup>1-4</sup> Wenn nicht absorbierte Kohlenhydrate in den Dickdarm eintreten, werden sie schnell durch anaerobe Dickdarmbakterien fermentiert zu kurzkettigen Fettsäuren, unter Freisetzung von Kohlendioxid, Wasserstoff und bei manchen Menschen, Methan.“
- „Die Einnahme von Wasserstoffwasser erhöhte den Atemwasserstoff rasch auf den maximalen Wert von etwa 40 ppm 10–15 Minuten nach der Einnahme und fiel danach rasch auf den Ausgangswert ab, während die Einnahme der gleichen Menge destillierten Wassers den Atemwasserstoff



Wasserstoffwasser  
= unter der Kurve





# 2011 Lebertumor-Bestrahlung und H<sub>2</sub>-Wasser

## Auswirkungen des Trinkens von wasserstoffreichem Wasser auf die Lebensqualität von Patienten, die mit Radiotherapie bei Lebertumoren behandelt werden.

Kang KM, Kang YN, Choi IB, Gu Y, Kawamura T, Toyoda Y, Nakao A. Effects of drinking hydrogen-rich water on the quality of life of patients treated with radiotherapy for liver tumors. Med Gas Res. 2011;1:11. doi: 10.1186/2045-9912-1-11

- „Während die Radiotherapie bösartige Zellen zerstört, beeinträchtigt dies die umgebenden normalen Zellen [ 2]. Akute strahlungsassoziierte Nebenwirkungen sind Müdigkeit, Übelkeit, Durchfall, trockener Mund, Appetitlosigkeit, Haarausfall, schmerzende Haut und Depressionen. Strahlung erhöht das Langzeitrisiko für Krebs, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Katarakte. ... Es wird angenommen, dass die meisten strahlungsinduzierten Symptome mit erhöhtem oxidativem Stress und Entzündungen aufgrund der Erzeugung reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) während der Strahlentherapie verbunden sind und die Lebensqualität des Patienten (QOL) signifikant beeinflussen können [ 2]“
- „Eine randomisierte, placebokontrollierte Studie wurde durchgeführt, um die Auswirkungen des Trinkens von wasserstoffreichem Wasser bei 49 Patienten zu bewerten, die eine Strahlentherapie bei malignen Lebertumoren erhalten.“
- „Der Konsum von wasserstoffreichem Wasser für 6 Wochen reduzierte die reaktiven Sauerstoffmetaboliten im Blut und hielt das Blutoxidationspotential aufrecht. Die QOL-Werte während der Strahlentherapie waren bei Patienten, die mit wasserstoffreichem Wasser behandelt wurden, im Vergleich zu Patienten, die Placebo-Wasser erhielten, signifikant verbessert. Es gab keinen Unterschied in der Tumorreaktion auf die Strahlentherapie zwischen den beiden Gruppen.“
- „Zusammenfassend zeigte unsere Studie, dass das Trinken von wasserstoffreichem Wasser die Lebensqualität verbessert und die oxidativen Marker bei Patienten reduziert, die eine Strahlentherapie bei Lebertumoren erhalten. Dieser neuartige Ansatz der oralen Einnahme von wasserstoffreichem Wasser kann auf eine Vielzahl strahlungsbedingter nachteiliger Symptome angewendet werden.“



# Forschungsüberblick 2011

## Jüngste Fortschritte auf dem Weg zur Wasserstoffmedizin: Potenzial molekularen Wasserstoffs für präventive und therapeutische Anwendungen

- Ohta S. Recent progress toward hydrogen medicine: potential of molecular hydrogen for preventive and therapeutic applications. Curr Pharm Des. 2011;17(22):2241-52.

Der Grundlagenforscher Shigeo Ohta diskutiert die Wirkung seiner Pionierarbeit von 2007.

1. „H<sub>2</sub> hat als potentiell Antioxidans eine Reihe von Vorteilen: H<sub>2</sub> diffundiert schnell in Gewebe und Zellen, und es ist mild genug, weder metabolische Redoxreaktionen zu stören noch reaktive Sauerstoffspezies (ROS) zu beeinflussen, die bei der Zellsignalisierung wirken. Dadurch sollte der Verbrauch von H<sub>2</sub> wenig nachteilige Auswirkungen haben.“
2. „Seit der Veröffentlichung des ersten H<sub>2</sub>-Papiers in Nature Medicine im Jahr 2007 wurden die biologischen Wirkungen von H<sub>2</sub> durch die Veröffentlichung von mehr als 38 Krankheiten, physiologischen Zuständen und klinischen Tests in führenden biologischen / medizinischen Zeitschriften bestätigt, und mehrere Gruppen haben mit klinischen Untersuchungen begonnen. Darüber hinaus zeigt H<sub>2</sub> nicht nur Wirkungen gegen oxidativen Stress, sondern auch verschiedene entzündungshemmende und antiallergische Wirkungen. H<sub>2</sub> reguliert verschiedene Genexpressionen und Proteinphosphorylierungen, obwohl die molekularen Mechanismen, die den ausgeprägten Effekten sehr geringer Mengen an H<sub>2</sub> zugrunde liegen, schwer zu fassen sind.“
3. „H<sub>2</sub> bindet •OH, aber nicht O<sub>2</sub><sup>-</sup>, H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> und NO in kultivierten Zellen.“
4. Übermäßiger oxidativer Schaden ist ein Hauptfaktor, da die mitochondriale Atmungskette eine bedeutende Quelle für schädigende reaktive Sauerstoffspezies ist. Trotz der klinischen Bedeutung von mitochondrialer oxidativer Schädigung waren Antioxidantien jedoch von begrenztem therapeutischem Erfolg. Dies kann daran liegen, dass Antioxidantien von Mitochondrien nicht selektiv aufgenommen werden [ 55 - 57 ]. Da H<sub>2</sub> effektiv den Zellkern und die Mitochondrien erreicht, deutet der Schutz von Kern-DNA und Mitochondrien auf präventive Wirkungen auf Lebensstil-Erkrankungen, Krebs und den Alterungsprozess hin.




# Grundlagen 2011: Fettleibigkeit und Diabetes

## Molekularer Wasserstoff verbessert Fettleibigkeit und Diabetes, indem er hepatisches FGF21 induziert und den Energiestoffwechsel in db / db-Mäusen stimuliert.

Kamimura, N. , Nishimaki, K. , Ohsawa, I. and Ohta, S. (2011), Molecular Hydrogen Improves Obesity and Diabetes by Inducing Hepatic FGF21 and Stimulating Energy Metabolism in *db/db* Mice. Obesity, 19: 1396-1403. doi:[10.1038/oby.2011.6](https://doi.org/10.1038/oby.2011.6)

- Die Forscher testeten die Vorteile des wasserstoffreichen Trinkwassers gegen **Typ-2-Diabetes** . Sie fanden heraus, " H<sub>2</sub> - Wasser zu trinken reduzierte den hepatischen oxidativen Stress und verringerte **signifikant die Fettleber** in db / db-Mäusen sowie die durch Fettnahrung induzierte Fettleber in Wildtyp-Mäusen. Langfristiges Trinken von H<sub>2</sub> -wasser **kontrollierte Fett- und Körpergewicht** signifikant , obwohl kein Anstieg von Diät- und Wasserverbrauch erfolgte, und durch das Trinken von H<sub>2</sub> -Wasser wurden die Glukose-, Insulin- und Triglyceridwerte im Plasma gesenkt, deren Wirkung bei Hyperglykämie der Ernährung ähnelte Beschränkung. „
- „Zuerst zeigen wir, dass Glykogen in der Leber nach Verabreichung von H<sub>2</sub>-Wasser Wasserstoff ansammelt, was erklärt, dass schon der Konsum einer kleinen Menge H<sub>2</sub> in kurzer Zeit die verschiedensten Krankheitsmodelle günstig beeinflusst. “
- “Das Trinken von Wasserstoffwasser reduzierte bei db/db Mäusen significant den hepatischen Stress und die durch Fett hervorgerufene Fettleber.”
- Um zu untersuchen, wie das Trinken von H<sub>2</sub> -Wasser die Fettleibigkeit und die metabolischen Parameter auf molekularer Ebene verbessert, untersuchten wir Gen-Expressionsprofile und fanden eine verstärkte Expression des Leberhormons Fibroblasten-Wachstumsfaktor 21 (FGF21), der zur Steigerung von Fettsäure und Glukose dient. Tatsächlich stimulierte H<sub>2</sub> den Energiemetabolismus, gemessen am Sauerstoffverbrauch. Die vorliegenden Ergebnisse legen den potenziellen Nutzen von H<sub>2</sub> für die Verbesserung von Fettleibigkeit, Diabetes und metabolischem Syndrom nahe.“





# 2011: H<sub>2</sub> Aerosol bei Strahlenpneumonitis

Eine mögliche Präventionsstrategie gegen Strahlenpneumonitis: Kombinieren Sie die Strahlentherapie mit der Aerosol-Inhalation einer wasserstoffreichen Lösung.

Yunhai Chuai, Luqian Zhao, Jin Ni, Ding Sun, Jianguo Cui, Bailong Li, Liren Qian, Fu Gao, Jianming Cai, A possible prevention strategy of radiation pneumonitis: Combined radiotherapy with aerosol inhalation of hydrogen-rich solution. *Med Sci Monit* 2011; 17(4): HY1-4. DOI: 10.12659/MSM.881698

- „Die Strahlentherapie ist eine wichtige Methode der Krebsbehandlung. Die Strahlenpneumonitis ist ein wesentliches Hindernis für die Erhöhung der Strahlendosis bei der Strahlentherapie, und es ist wichtig, diese strahlungsinduzierte Komplikation zu verhindern. Neuere Studien zeigen, dass Wasserstoff als wirksames und sicheres Strahlenschutzmittel durch selektive Reduktion von Hydroxyl- und Peroxynitrit-Radikalen ein Potenzial hat. Da der Großteil der durch ionisierende Strahlung verursachten Zellschädigung durch Hydroxylradikale verursacht wird, können wir annehmen, dass eine Kombination aus Strahlentherapie mit Inhalation mit Aerosol einer wasserstoffreichen Lösung eine wirksame und neuartige Präventionsstrategie für Strahlenpneumonitis darstellen kann.“
- „Unsere Hypothese ist, dass eine Behandlung, die eine Strahlentherapie mit einer Inhalation von wasserstoffreichen Lösungen mit Aerosol kombiniert, eine sichere, wirksame und neuartige Präventionsstrategie für Strahlenpneumonitis sein kann. Während der Bestrahlung der Brust kann die Inhalation einer wasserstoffreichen Lösung durch Aerosol schnell die durch Bestrahlung in der normalen Lunge erzeugten Radikale abfangen.“
- „Die Wasserradiolyse erfolgt auf einer Zeitskala von  $10^{-18}$  –  $10^{-12}$  Sekunden, und die meisten Radikalreaktionen sind innerhalb von 1 Sekunde abgeschlossen [ 34 ]. Die durch Wasserradiolyse entwickelten freien Radikale müssen schnell und kontinuierlich eliminiert werden. Die 2 Behandlungen (Bestrahlung der Brust und Inhalation einer wasserstoffreichen Lösung mit Aerosol) sollten gleichzeitig verabreicht werden.“



# 2012: Muskelermüdung beim Fußball

## Pilotstudie: Auswirkungen des Trinkens von wasserstoffreichem Wasser auf die durch akute Bewegung hervorgerufene Muskelermüdung bei Spitzensportlern

Aoki K, Nakao A, Adachi T, Matsui Y, Miyakawa S. Pilot study: Effects of drinking hydrogen-rich water on muscle fatigue caused by acute exercise in elite athletes. *Med Gas Res.* 2012;2:12. Published 2012 Jul 12. doi:10.1186/2045-9912-2-12

- „Zehn männliche Fußballspieler im Alter von  $20,9 \pm 1,3$  Jahren wurden Belastungstests und Blutproben unterzogen.“ „Die endgültigen Wasserstoffkonzentrationen des Placebo-Wassers (PW) und des wasserstoffreichen Wassers (HW) betrugen 0 bzw. 0,92 bis 1,02 mM [ 9 , 11 ]. Jedes Subjekt wurde zweimal im Crossover-Doppelblindmodus untersucht, wobei entweder HW oder PW für einwöchige Intervalle gegeben wurde.“
- „Obwohl eine akute Bewegung zu einem Anstieg der Blutlaktatspiegel bei den Probanden führte, denen PW verabreicht wurde, verhinderte die orale Aufnahme von HW eine Erhöhung der Blutlaktatkonzentration bei starker Belastung. Das maximale Drehmoment von PW nahm während der maximalen isokinetischen Knieextension signifikant ab, was auf Muskelermüdung schließen lässt, aber das maximale Drehmoment von HW nahm in der frühen Phase nicht ab. Es gab keine signifikante Veränderung der Blut-Oxidationsverletzungsmarker (D-ROMs und BAP) oder der Kreatin-Kinase nach dem Training.“
- Zusammenfassend zeigten unsere vorläufigen Daten, dass der Verbrauch von HW den Blutlaktatspiegel senkte und die Muskelermüdung nach akutem Training verbesserte. Obwohl weitere Studien unbedingt erforderlich sind, wäre das Trinken von HW eine neuartige und effektive Strategie zur Flüssigkeitshydratation für Sportler.



# 2019: Sport, Mikrobiom und H<sub>2</sub>-Wasser

## Auswirkungen des langfristigen Verbrauchs von wasserstoffreichem Wasser auf die antioxidative Aktivität und die Darmflora von weiblichen Fußballspielerinnen aus Suzhou, China

Sha JB, Zhang SS, Lu YM, et al. Effects of the long-term consumption of hydrogen-rich water on the antioxidant activity and the gut flora in female juvenile soccer players from Suzhou, China. *Med Gas Res.* 2019;8(4):135-143. Published 2019 Jan 9. doi:10.4103/2045-9912.248263

- Die Studie untersuchte die Auswirkungen des zweimonatigen Verbrauchs von wasserstoffreichem Wasser auf die Darmflora von jugendlichen Fußballerinnen.
- „Die Ergebnisse menschlicher Experimente mit Sportlern haben gezeigt, dass eine höhere Belastungsintensität zu erhöhtem oxidativem Stress im Körper und somit zu einer erhöhten Inzidenz von gastrointestinalen Stresssymptomen führt. Daher sollten Athleten während des Trainingsprozesses eine ausreichende Menge an selektivem, wasserstoffreichem Antioxidationsmittel trinken, um die Darmflora zu regulieren. Dies kann einen schützenden Effekt auf den Magen-Darm-Trakt haben und Stressreaktionen reduzieren.“
- Nach 8-wöchiger Behandlung mit wasserstoffreichem Wasser waren bei Athleten mit kürzerer Trainingsdauer der Reichtum und die Vielfalt der Darmflora immer noch höher als bei Kontrollpersonen mit längerem Training. Außerdem nahmen die Serumspiegel von MDA, IL-1, IL-6 und TNF- $\alpha$  ab, und die Spiegel von HGB-SOD und T-AOC stiegen in der Gruppe mit wasserstoffreichem Wasser in unterschiedlichem Maße an. Der Trend günstiger Änderungen der motorischen Funktionsindizes, des oxidativen Reaktionsindex und der Entzündungsfaktorindizes stimmte nahezu mit den Änderungen des Reichtums und der Diversität der Darmflora überein.
- Die obigen Ergebnisse zeigten, dass der langfristige Verbrauch von wasserstoffreichem Wasser nicht nur bestimmte antioxidative und entzündungshemmende Wirkungen ausübt, sondern auch die Vielfalt und die Abundanz der Darmflora der Probanden erhöht.





# Forschungsüberblick 2012

## Molekularer Wasserstoff als aufstrebendes therapeutisches medizinisches Gas für neurodegenerative und andere Krankheiten

- Ohno K, Ito M, Ichihara M, Ito M. Molecular hydrogen as an emerging therapeutic medical gas for neurodegenerative and other diseases. Oxid Med Cell Longev. 2012;2012:353152.

„Die Auswirkungen von Wasserstoff auf verschiedene Krankheiten wurden vier molekularen Hauptmechanismen zugeschrieben: einer spezifischen Abfangaktivität von Hydroxylradikalen, einer Abfangaktivität von Peroxynitrit, Veränderungen der Genexpression und signalmodulierenden Aktivitäten.“

Die Forscher sprechen erstmals von einem **„Rätseln der Wasserstoffwirkungen“**:

1. „ Die Wasserstoffmenge, die durch 2% Wasserstoffgas gegeben wird, sollte mindestens 104 Mal höher sein als diejenige, die durch das Trinken von Wasserstoffwasser erreicht wird... Dennoch ist Wasserstoffwasser genauso wirksam wie Wasserstoffgas oder manchmal sogar wirksamer. Darüber hinaus kann oral aufgenommener Wasserstoff leicht in Magen, Darm, Leber, Herz und Lunge verteilt werden, geht jedoch meistens beim Ausatmen verloren.“
2. Obwohl keine Säugetierzellen endogen Wasserstoff erzeugen können, wird Wasserstoff von Darmbakterien produziert, die sowohl bei Nagetieren als auch beim Menschen Hydrogenase tragen. Wir Menschen können in unserem Darm maximal 12 Liter Wasserstoff erzeugen.... Die Menge an Wasserstoff, die von Wasser oder Gas aufgenommen wird, ist viel geringer als die von Darmbakterien, aber der exogen verabreichte Wasserstoff zeigt eine herausragende Wirkung.“
3. Auswirkungen von Wasserstoff wurden in 63 Krankheitsmodellen und menschlichen Erkrankungen berichtet ( Tabelle 1 ). Nur zwei Erkrankungen des Hirninfarkts und des metabolischen Syndroms wurden sowohl bei Nagetieren als auch beim Menschen untersucht. Das Fehlen nachteiliger Wirkungen von Wasserstoff ermöglichte klinische Studien auch ohne Tierversuche.



# LDL - Cholesterin (2013)

## Wasserstoffhaltiges Wasser senkt den LDL-Cholesterinspiegel im Serum und verbessert HDL-Funktion bei Patienten mit potenziellem metabolischem Syndrom

- Song G, Li M, Sang H, et al. Hydrogen-rich water decreases serum LDL-cholesterol levels and improves HDL function in patients with potential metabolic syndrome. J Lipid Res. 2013;54(7):1884-93.
- In dieser Studie von 2013 mussten die Probanden eine oder mehrere der folgenden Bedingungen haben: Prehypertonie (diastolischer Blutdruck von 80–89 mmHg und systolischer Blutdruck von 139 mmHg oder niedriger); Prädiabetes (Nüchternserumglukose von 5,2 bis 6,9 mmol / l); TC > 5,18 mmol / l und / oder LDL-C > 2,59 mmol / l; Body-Mass-Index (BMI) zwischen 25,0 und 34,9 kg / m<sup>2</sup>; oder Taillenumfang ≥ 100 cm für Männer und ≥ 88 cm für Frauen.
- Herstellung des Wasserstoffwassers durch metallisches Magnesium. „Die H<sub>2</sub>-Konzentration wurde zwischen 0,2 und 0,25 mM und der pH zwischen 7,8 und 8,2 gehalten, gemessen 15 Minuten nach dem Öffnen des versiegelten Flaschenverschlusses durch einen H<sub>2</sub>-Sensor (Unisense, Dänemark).“
- „Wasserstoffgas ist an die Spitze der therapeutischen medizinischen Gasforschung gerückt. Akkumulierte Beweise in einer Vielzahl von biomedizinischen Gebieten, die klinische und experimentelle Modelle für viele Krankheiten verwenden, beweisen, dass H<sub>2</sub>, das entweder durch Gasinhalation oder durch den Konsum einer wässrigen H<sub>2</sub>-haltigen Lösung verabreicht wird, als mögliche therapeutische Strategie in verschiedenen Krankheitsmodellen wirken kann.“
- „Tatsächlich liefern unsere Daten einen Hinweis darauf, dass H<sub>2</sub> das Potenzial hat, als neuartiges Lipid-regulierendes Mittel verwendet zu werden, mit dem Vorteil, dass es im Vergleich zu anderen üblicherweise verwendeten Lipid-regulierenden Arzneimitteln, die Nebenwirkungen auf Leber und Niere haben, keine Toxizität aufweist“.



# 2013: Frühbehandlung Rheumatoide Arthritis (RA)

## Molekularer Wasserstoff: Neue antioxidative und entzündungshemmende Therapie bei rheumatoider Arthritis und verwandten Erkrankungen.

Ishibashi T. Molecular hydrogen: new antioxidant and anti-inflammatory therapy for rheumatoid arthritis and related diseases. Curr Pharm Des. 2013;19(35):6375-81.

**Diese Arbeit von 2013 zeigt, dass das Trinken von hochgesättigtem Wasserstoffwasser (5 mg/Liter) oxidativen Stress bei Patienten mit rheumatoider Arthritis reduziert .**

„ Rheumatoide Arthritis (RA) ist eine chronische entzündliche Erkrankung, die etwa 1% der Bevölkerung betrifft. Es ist durch eine irreversible Gelenkstörung gekennzeichnet, die mit einer Zerstörung von Knochen und Knorpel einhergeht, was zu schwerwiegender Morbidität führt. Darüber hinaus kann die chronische Entzündung, die mit RA einhergeht, das Atheroskleroserisiko erhöhen, das eine wesentliche Todesursache bei Herz-Kreislaufversagen darstellt“

„ H<sub>2</sub> ist ein in dem menschlichen Körper vorhandenes inertes Gas und wird nicht als Arzneimittel eingestuft, aber es wurde gezeigt, dass es ein therapeutisches und diagnostisches Potenzial für RA hat“

„ Wir gehen davon aus, dass die H<sub>2</sub>-Therapie in einem sehr frühen Stadium den Beginn der RA verhindern kann, wenn sie Loop 3 zu Beginn der Autoimmunreaktion stören kann, indem sie das ROS-bedingte Neo-Epitop reduziert. Alternativ kann die mögliche Aktivierung von proinflammatorischen Zytokinen, die die Autoimmunreaktion auslösen können, durch den täglichen H<sub>2</sub> Konsum verhindert werden.“





# 2013: Wasserstoffwasser und Hepatitis B

## Einfluss von wasserstoffreichem Wasser auf oxidativen Stress, Leberfunktion und Viruslast bei Patienten mit chronischer Hepatitis B

Xia C, Liu W, Zeng D, Zhu L, Sun X, Sun X. Effect of hydrogen-rich water on oxidative stress, liver function, and viral load in patients with chronic hepatitis B. Clin Transl Sci. 2013;6:372–375.

- 30/30 Patienten mit moderater stationärer chronischer Hepatitis B (CHB) . Randomisiert, kontrolliert, einfachblind 6 Wochen lang mit Wasserstoffwasser (1,2 – 1,8 l/Tag) bzw. Standardbehandlung und unbehandeltes Trinkwasser. Wasserstoffkonzentration: 0,55-0,65 mM)
- „Ziel dieser Studie war es, die Wirkung von wasserstoffreichem Wasser auf oxidativen Stress (Superoxiddismutase [SOD]; Glutathion S transferase [GST]; Xanthinoxidase [XOD]; Malondialdehyd [MDA]), Leberfunktion (Alaninaminotransferase [ALT]) zu untersuchen. Gesamt-Gallensäure [Tbil], Cholinesterase [ChE]) und HBV-Belastung bei Patienten mit CHB.“
- „Die Leberfunktion wurde signifikant verbessert und die HBV-DNA wurde nach entsprechenden Behandlungen deutlich reduziert. Obwohl ein signifikanter Unterschied beim oxidativen Stress zwischen zwei Gruppen nach der Behandlung festgestellt wurde, waren die Leberfunktion und der HBV-DNA-Spiegel nach der Behandlung vergleichbar und beide hatten eine verbesserte Tendenz.“
- „Zusammengenommen kann wasserstoffreiches Wasser den oxidativen Stress abschwächen und möglicherweise die Leberfunktion verbessern und den HBV-DNA-Spiegel bei CHB-Patienten reduzieren.“



# Forschungsüberblick 2013

## Die Evolution des molekularen Wasserstoffs: eine bemerkenswerte mögliche Therapie mit klinischer Bedeutung

- Dixon BJ, Tang J, Zhang JH. The evolution of molecular hydrogen: a noteworthy potential therapy with clinical significance. Med Gas Res. 2013;3(1):10. Published 2013 May 16. doi:10.1186/2045-9912-3-10
1. „Die erste dokumentierte Entdeckung des Wasserstoffs fand 1520 von Philippus Aureolus Paracelsus statt. Paracelsus entdeckte unwissentlich ein brennbares Gas, indem er etwas Metall mit einer Säure verbrannte und die Produkte sammelte (Royal Chemistry Society). Nachdem Paracelsus dieses mysteriöse brennbare Gas entdeckt hatte, wiederholten andere den Prozess und begannen, mit dem Gas zu arbeiten. Wasserstoffgas hatte jedoch nie einen offiziellen oder gebräuchlichen Namen. Erst 1783 benutzte Lavoisier, der oft als moderner Vater der Chemie bezeichnet wird, das französische Wort „Wasserstoff“, um das Gas zu beschreiben (Royal Chemistry Society).“
  2. Die fehlenden Erklärungen, wie Wasserstoff das Hydroxylradikal abfängt, und wie Wasserstoff an der Signalisierung und Aktivierung von Zellen beteiligt ist, die Unterdrückung von Signalwegen, wie Wasserstoff mit anderen Antioxidantien interagiert, um die Zytoprotektion zu fördern, und wie Wasserstoff Entzündungen reduzieren kann, ist wichtig. Auch die Wirksamkeit spezifischer Konzentrationen in verschiedenen Krankheitsmodellen sowie die optimalen Verabreichungsformen müssen bestimmt werden.
  3. Obwohl die Wirksamkeitsergebnisse von molekularem Wasserstoff positiv sind, gibt es einige Einschränkungen. Matchett et al. berichteten, dass Wasserstoffgas unwirksam ist, wenn in einem hypoxischen Rattenmodell für Neugeborene mäßige bis schwere Schäden auftraten. Die Ergebnisse zeigen, dass es möglich ist, dass schwere Ischämieschäden die Auswirkungen der Wasserstoffbehandlung überfordert haben. Dies deutet darauf hin, dass eine längere Exposition gegenüber Wasserstoff oder unterschiedliche Konzentrationen eine günstigere Wirkung haben können oder dass Wasserstoff nur bei leichten Hirnverletzungen wirksam sein kann [ 46 ].




# Grundlagen 2014: Reanimation nach Herzstillstand

- Die Inhalation von Wasserstoff während der normoxischen Wiederbelebung verbessert das neurologische Ergebnis in einem Rattenmodell für Herzstillstand, unabhängig von einem gezielten Temperaturmanagement

Kei Hayashida, Motoaki Sano, Naomi Kamimura, Takashi Yokota, Masaru Suzuki, Shigeo Ohta, Keiichi Fukuda, and Shingo Hori, Hydrogen Inhalation During Normoxic Resuscitation Improves Neurological Outcome in a Rat Model of Cardiac Arrest Independently of Targeted Temperature Management Originally published 3 Nov 2014 <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.114.011848> Circulation. 2014;130:2173–2180

- Die Forscher zeigen, wie vorteilhaft die H<sub>2</sub>-Inhalation ist (mit oder ohne Beginn einer anderen Behandlung), nachdem ein Patient eine Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) erhalten hat. Sie sagen, "es **verbessert Gehirn und Herzfunktion** in einem Rattenmodell des Herzstillstands (CA) signifikant."
- Zur Inhalation wurde ein Mischgas 1,3% H<sub>2</sub> and 26% O<sub>2</sub> verwendet.
- "Unsere Ergebnisse zeigen ein mögliches neues Therapiemodell nach einem Herzstillstand, das leicht anwendbar ist. Diese Studie dürfte den Weg der Wasserstoff-Inhalationstherapie in den klinischen Alltag fördern."





# 2014: Diabetes Typ 1 im Tiermodell

## Wasserstoff verbessert die glykämische Kontrolle im Typ1-Diabetikertiermodell durch Förderung der Glukoseaufnahme in den Skelettmuskel

Amitani H, Asakawa A, Cheng K, et al. Hydrogen improves glycemic control in type1 diabetic animal model by promoting glucose uptake into skeletal muscle. *PLoS One*. 2013;8(1):e53913.

- „H<sub>2</sub> ist ein starker Abfänger reaktiver Sauerstoffspezies (ROS). Sowohl die vermehrte Erzeugung von ROS als auch die Beeinträchtigung der Abwehr von Antioxidantien verursachen oxidativen Stress, den Prozess der Zellschädigung. Die mitochondriale Elektronentransportkette ist in den meisten Zellen die Hauptquelle für ROS [25]. Die Abgabe eines Elektrons an molekularen Sauerstoff führt zur Bildung von Superoxid (O<sub>2</sub><sup>-</sup>) [26]. Bei der physiologischen Homöostase wird O<sub>2</sub><sup>-</sup> durch das Enzym Superoxiddismutase (SOD) in Wasserstoffperoxid (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) umgewandelt, und H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> wird durch die Enzyme Catalase oder Glutathionperoxidase in Wasser umgewandelt [27]. In Gegenwart von reduzierten Übergangsmetallen (z. B. Eisen- oder Kupfer (I) -ionen) kann H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> in das am stärksten reaktive Hydroxylradikal (·OH) umgewandelt werden [28].“
- „Unsere Studie zeigt zum ersten Mal, dass H<sub>2</sub> die glykämische Kontrolle in einem STZ-induzierten Typ-1-Diabetikertiermodell verbessert, ohne Hypoglykämie zu erzeugen. Dies wurde nicht nur durch intraperitoneale Verabreichung von H<sub>2</sub> erreicht, sondern auch durch orale Verabreichung trotz der instabilen Natur von H<sub>2</sub> im Wasser.“
- „Die Zugabe von Salzen wie Natriumchlorid könnte helfen, die H<sub>2</sub>-Konzentrationen im Wasser aufrechtzuerhalten“
- „Weder grobe Verhaltensauffälligkeiten noch offensichtliche biochemische Veränderungen wie Leber- und Nierenfunktionen wurden während der Versuchsperiode von 1 bis 4 Monaten beobachtet. Diese Ergebnisse zeigen, dass die H<sub>2</sub>-Therapie mehrere Nachteile der Insulintherapie überwinden könnte.“
- „Daher legen die vorliegenden Ergebnisse der verbesserten glykämischen Kontrolle durch orale Verabreichung von H<sub>2</sub> stark nahe, dass H<sub>2</sub> ein neuartiges therapeutisches Molekül ist, das die Behandlung von Typ-1-Diabetes unterstützen kann.“




# Studie 2014: Trinken gegen Hirnschäden

## Molekularer Wasserstoff in Trinkwasser schützt vor neurodegenerativen Veränderungen, die durch traumatische Gehirnverletzung hervorgerufen werden

Dohi K, Kraemer BC, Erickson MA, et al. Molecular hydrogen in drinking water protects against neurodegenerative changes induced by traumatic brain injury. *PLoS One*. 2014;9(9):e108034. Published 2014 Sep 24. doi:10.1371/journal.pone.0108034

- „Traumatische Hirnverletzungen (TBI) in ihren verschiedenen Formen haben sich zu einem Hauptproblem der modernen Gesellschaft entwickelt. Akute TBI kann sich in einen chronischen Zustand verwandeln und ein Risikofaktor für neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer- und Parkinson-Erkrankungen sein, wahrscheinlich durch Induktion von oxidativem Stress und Neuroinflammation. Hier untersuchten wir die Fähigkeit des in Trinkwasser enthaltenen Antioxidans molekularen Wasserstoffs (molekulares Wasserstoffwasser; mHW), die akuten Veränderungen zu beeinflussen, die durch kontrollierte kortikale Wirkung (CCI) induziert werden, ein häufig verwendetes experimentelles Modell für TBI.“
- „Schließlich haben wir festgestellt, dass mHW die ATP-Spiegel aufrechterhalten oder erhöht hat, und schlagen einen neuen Mechanismus für mHW vor, den der ATP-Produktion durch die Jagendorf-Reaktion. Diese Ergebnisse zeigen, dass molekularer Wasserstoff, der in Trinkwasser verabreicht wird, viele der Folgen von CCI rückgängig macht, und legt nahe, dass es sich um eine einfach zu verabreichende, hochwirksame Behandlung von TBI handeln könnte.“
- „Wir schlagen vor, dass molekularer Wasserstoff auch einen Wasserstoffgradienten erzeugt, wodurch die mitochondriale ATP-Produktion unabhängig von der Elektronentransportkettenaktivität gefördert wird. Daher kann molekularer Wasserstoff zum Teil dadurch arbeiten, dass er das ATP-Defizit, das TBI-Zellen durchläuft, mit einem Mitochondrienschaden [34] überwindet.“
- Insgesamt belegen diese Studien das Prinzip, dass mHW viele der Auswirkungen von CCI wirksam umkehren, blockieren oder abschwächen kann. Dazu gehören Auswirkungen auf die Ödembildung, Tau-Pathologie, Regulatoren der Flüssigkeits- und BBB-Funktionen, Neuroinflammation und Genexpression.“




# Forschungsüberblick 2014

## Molekularer Wasserstoff als präventives und therapeutisches medizinisches Gas: Initiierung, Entwicklung und Potenzial der Wasserstoffmedizin.

Ohta, S., Molecular hydrogen as a preventive and therapeutic medical gas: initiation, development and potential of hydrogen medicine, [Pharmacology & Therapeutics Volume 144, Issue 1](#), October 2014, Pages 1-11, <https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2014.04.006>

- „H<sub>2</sub> hat eine Reihe von Vorteilen, die weitreichende Wirkungen zeigen: H<sub>2</sub> diffundiert schnell in Gewebe und Zellen, und es ist mild genug, weder metabolische Redoxreaktionen zu stören noch die Signalisierung reaktiver Sauerstoffspezies zu beeinflussen.“
- „Die zahlreichen Veröffentlichungen zum biologischen und medizinischen Nutzen haben gezeigt, dass H<sub>2</sub> den oxidativen Stress nicht nur durch direkte Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln, sondern auch indirekt durch die Regulierung verschiedener Genexpressionen reduziert. Darüber hinaus wird durch Regulierung der Genexpression H<sub>2</sub> wirkt entzündungshemmend und apoptotisch und regt den Energiestoffwechsel an.“
- "H<sub>2</sub> scheint sich von herkömmlichen Arzneimitteln zu unterscheiden. Aufgrund der hohen Wirksamkeit und des Fehlens unerwünschter Wirkungen hat H<sub>2</sub> ein vielversprechendes Potenzial für die klinische Anwendung gegen viele Krankheiten."
- „Da die meisten Medikamente spezifisch auf ihre Ziele wirken, scheint sich H<sub>2</sub> von herkömmlichen Arzneimitteln zu unterscheiden. H<sub>2</sub> bietet aufgrund seiner hohen Wirksamkeit und des Fehlens nachteiliger Wirkungen ein vielversprechendes Potenzial für die klinische Anwendung gegen viele Krankheiten.“
- „In Bezug auf die Sicherheit von H<sub>2</sub> für den medizinischen Gebrauch sollte hier folgender Punkt hervorgehoben werden : H<sub>2</sub> -Gas ist nur bei Temperaturen über 527 ° C entflammbar und explodiert durch eine schnelle Kettenreaktion mit O<sub>2</sub> nur im Explosionsbereich bei H<sub>2</sub> Konzentration (4-75%, vol / vol). Somit kann H<sub>2</sub> für medizinische Anwendungen ohne zusätzliche Sorgen durch mehrere Aufnahmeverfahren verwendet werden, da die Inhalation von 1–4% H<sub>2</sub> -Gas eine hohe Wirksamkeit zeigt ( [Ohsawa et al., 2007](#), [Hayashida et al., 2008](#) ).“





# Forschungsüberblick 2016

## Molekularer Wasserstoff: ein therapeutisches Antioxidans und mehr

Molecular hydrogen: a therapeutic antioxidant and beyond [Lei Huang](#), M.D.

Published online 2016 Dec 30. doi: [10.4103/2045-9912.196904](#)

Dies ist ein **allgemeiner Überblick über die molekularen Wasserstoff-Forschung aus dem Jahr 2016** in den Bereichen: postkardiales Syndrom, Parkinson, metabolisches Syndrom, rheumatoide Arthritis, zerebrale Ischämie und Hämodylisis. Die Arbeit zeigt die biologischen Vorteile von H<sub>2</sub> Therapien sowie klinische Anwendungen auf: Fazit:

- "Insgesamt ist der Einfluss von molekularem Wasserstoff in der Medizin außergewöhnlich. Die ungiftigen und schnellen intrazellulären Diffusionsmerkmale dieses biologischen Gases gewährleisten die Durchführbarkeit und Eignung für eine klinische Anwendung."



# Humanstudie 2016 zur Inhalation

## Machbarkeit und Sicherheit der Wasserstoffgasinhalation bei Post-Herzstillstand-Syndrom - Erste Pilotstudie am Menschen

Tamura T, et al. Feasibility and safety of hydrogen gas inhalation for post-cardiac arrest syndrome - first-in-human pilot study. Circ J. 2016;80:1870–1873. doi: 10.1253/circj.CJ-16-0127

- „Zwischen Januar 2014 und Januar 2015 erreichten 21 von 107 Patienten mit Herzstillstand außerhalb des Krankenhauses eine spontane Rückkehr des Kreislaufs. Nach Ausschluss von 16 Patienten mit bestimmten Kriterien wurden 5 Patienten mit Zieltemperaturmanagement (TTM) einer Wasserstoffinhalations-Behandlung unterzogen. Es wurden keine Nebenwirkungen beobachtet, die auf HI zurückzuführen sind, und 4 Patienten überlebten 90 Tage mit einem günstigen neurologischen Ergebnis.“
- „Nach unserem besten Wissen war dies eine erste Studie am Menschen, in der die Durchführbarkeit und Sicherheit von HI während der Behandlung mit PCAS bewertet wurde. HI hat die PCAS-Pflege, einschließlich TTM, nicht beeinträchtigt.“
- „Wir kamen zu dem Schluss, dass HI für Patienten mit PCAS ein sicheres und praktikables Verfahren ist und daher als neuartiger Therapieansatz für PCAS-Patienten betrachtet werden kann.“




# Studien 2016: H<sub>2</sub> + O<sub>2</sub> Kombibehandlung

## Die Kombinationstherapie von molekularem Wasserstoff und Hyperoxie verbessert die Überlebensrate und Organschäden in einem Zymosan-induzierten generalisierten Entzündungsmodell

Hong, Y., Sun, L., Sun, R., Chen, H., Yu, Y., & Xie, K. (2016). Combination therapy of molecular hydrogen and hyperoxia improves survival rate and organ damage in a zymosan-induced generalized inflammation model. *Experimental and Therapeutic Medicine*, 11, 2590-2596.  
<https://doi.org/10.3892/etm.2016.3231>

- „Das Multiple Organ Dysfunction Syndrom (MODS) ist eine der häufigsten Todesursachen bei kritisch kranken Patienten. Eine Behandlung mit Hyperoxie kann für kritisch kranke Patienten von Vorteil sein. Die klinische Anwendung von Hyperoxie wird jedoch behindert, da sie die Organverletzung durch Erhöhung der reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) verschlimmern kann. Wasserstoffgas (H<sub>2</sub>) übt eine therapeutische antioxidative Wirkung aus, indem ROS selektiv reduziert wird.“
- „Die Mischgase wurden auf den folgenden Konzentrationen gehalten: 2% H<sub>2</sub>, 21% O<sub>2</sub> und 77% N<sub>2</sub>; 0% H<sub>2</sub>, 98% O<sub>2</sub> und 2% N<sub>2</sub>; und **2% H<sub>2</sub>, 98% O<sub>2</sub> und 0% N<sub>2</sub>.**“
- „Die Ergebnisse zeigten, dass allein die Inhalation von H<sub>2</sub> (2%) oder Hyperoxie (98%) die 14-tägige Überlebensrate von Mäusen mit ZY-Exposition von 20 auf 70 bzw. 60% verbesserte. Eine Kombinationstherapie mit H<sub>2</sub> und Hyperoxie könnte jedoch die 14-tägige Überlebensrate von ZY-infizierten Mäusen auf 100% erhöhen.“
- „Zusammenfassend bietet die Kombinationstherapie mit H<sub>2</sub> und Hyperoxie eine verbesserte therapeutische Wirksamkeit gegen multiple Organschäden in einem ZY-induzierten generalisierten Entzündungsmodell, was die mögliche Anwendbarkeit von H<sub>2</sub> und Hyperoxie bei der Therapie von mit entzündungsbedingten MODS verbundenen Zuständen nahelegt.“





# Forschungsüberblick 2017

## Molekularer Wasserstoff als Neuroprotektivum.

- Iketani M, Ohsawa I. Molecular Hydrogen as a Neuroprotective Agent. Curr Neuroparmacol. 2017;15(2):324-331.
1. „Obwohl die meisten neurologischen Störungen derzeit nicht heilbar sind, deuten diese Studien auf das klinische Potenzial der H<sub>2</sub>-Verabreichung für ihre Prävention, Behandlung und Milderung hin. Einige der potenziellen Effektoren von H<sub>2</sub> werden ebenfalls diskutiert, darunter Zellsignalmoleküle und Hormone, die für die Verhinderung von oxidativem Stress und Entzündungen verantwortlich sind.“
  2. „Oxidativer Stress leitet sich von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) ab, wie Superoxidanionradikal (O<sub>2</sub><sup>-</sup>), Wasserstoffperoxid (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>), Stickoxid und Hydroxylradikal (OH<sup>·</sup>). Kürzlich wurde berichtet, dass molekularer Wasserstoff (H<sub>2</sub>) selektiv das hochtoxische ROS OH<sup>·</sup> und Peroxynitrit reduziert, nicht aber O<sub>2</sub><sup>-</sup>, H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> oder Stickstoffoxid. Inhalation von H<sub>2</sub>Gas unterdrückt die Ischämie-Reperfusionsverletzung (IRI) des Gehirns durch die Pufferung von oxidativem Stress deutlich [ 2 ]. Nachfolgende Studien berichteten ferner über die schützende Wirkung von H<sub>2</sub> auf die Herz- und Leber-IRI [ 3 , 4 ]. Die Ergebnisse dieser Studien zeigen, dass H<sub>2</sub> das Potenzial hat, eine wirksamere antioxidative Therapie zu sein als herkömmliche Entscheidungen. Da H<sub>2</sub> schnell durch Zellmembranen diffundiert, kann es zytotoxische ROS erreichen und mit diesen reagieren.“
  3. „Das OH<sup>·</sup> wird durch die Fenton-Reaktion erzeugt [ 15 ] und wird zu einer Hauptursache für die Oxidation und Zerstörung von Molekülen durch direkte Reaktionen oder durch Auslösen der Kettenreaktion freier Radikale [ 16 ]. Daher ist eine Antioxidantientherapie nur für OH-abhängige Verletzungen erforderlich, um die durch oxidativen Stress hervorgerufenen Krankheiten zu heilen, was darauf hinweist, dass H<sub>2</sub> ein ideales Reduktionsmittel für diesen Zweck ist.“
  4. Das Gehirn ist anfälliger für oxidativen Stress als andere Organe. Antioxidantien sind im Gehirn trotz des hohen Sauerstoffverbrauchs (20% der Gesamtmenge im Ruhezustand) relativ niedrig [ 17 , 18 ].“



# Grundlagenforschung 2017: Mitohormese

## Molekularer Wasserstoff schützt vor dem durch oxidativen Stress induzierten SH-SY5Y-Neuroblastom-Zelltod durch den Prozess der Mitohormese

- Murakami Y, Ito M, Ohsawa I (2017) Molecular hydrogen protects against oxidative stress-induced SH-SY5Y neuroblastoma cell death through the process of mitohormesis. PLOS ONE 12(5): e0176992. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176992>
- Die Forscher fanden heraus, dass " Inhalation von molekularem Wasserstoffgas ( $H_2$ ) das durch oxidativen Stress hervorgerufene akute Verletzungen im Gehirn verbessert." Sie untersuchten die vorteilhaften Wirkungen der Inhalation von molekularem Wasserstoff durch die Untersuchung von **Neuroblastomzellen (einer bestimmten Art von Krebs)** infizierter Ratten nach dem Tod.
- „Die Inhalation von molekularem Wasserstoffgas ( $H_2$ ) verbessert die durch oxidativen Stress hervorgerufenen akuten Verletzungen im Gehirn. Der Verbrauch von Wasser, das nahezu mit  $H_2$  gesättigt ist, verhindert auch chronische neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson in Tierversuchen und klinischen Studien.“
- „In der aktuellen Studie untersuchten wir die Wirkung von  $H_2$  auf Mitochondrien in kultivierten Neuroblastom-SH-SY5Y-Zellen und stellten fest, dass  $H_2$  das Mitochondrienmembranpotential ( $\Delta\Psi_m$ ) und den zellulären ATP-Spiegel erhöhte , wobei gleichzeitig das reduzierte Glutathion (GSH) abnahm ) “
- „Zusammenfassend kann man sagen, dass die **Vorbehandlung** mit  $H_2$  den durch  $H_2O_2$  induzierten Zelltod verhindert, die Aktivitäten der Mitochondrien verstärkt, den oxidativen Stress erhöht und die Expression von antioxidativen Enzymen induziert. Basierend auf  $H_2$  -induzierten adaptiven Antworten *in vitro* und *in vivo betrachten* wir nun, dass  $H_2$  als sogenannter mito-hormetischer Effektor gegen oxidativen Stress fungiert.“



# Humanstudie 2017 zur Inhalation

## Wasserstoffgas-Inhalationsbehandlung bei akutem Hirninfarkt: Eine randomisierte kontrollierte klinische Studie zu Sicherheit und Neuroprotektion

Ono H, Nishijima Y, Ohta S, et al. Hydrogen gas inhalation treatment in acute cerebral infarction: a randomized controlled clinical study on safety and neuroprotection. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2017;26:2587–2594

- Randomisierten kontrollierte klinische Studie zur Sicherheit und Wirksamkeit der H<sub>2</sub>-Inhalationsbehandlung bei Patienten mit Hirninfarkt in einem akuten Stadium mit leichtem bis mittlerem Schweregrad (NIHSS = 2-6) bewertet. . 50 Patienten (jeweils 25 in der H<sub>2</sub>-Gruppe und der Kontrollgruppe) mit einem therapeutischen Zeitfenster von 6 bis 24 Stunden. Die H<sub>2</sub>-Gruppe inhalierte 3% H<sub>2</sub>-Gas (1 Stunde 2 x tägl). die Kontrollgruppe erhielt konventionelle intravenöse Medikamente für die ersten 7 Tage. Die Behandlung war sicher und effektiv.
- „Die Behandlung mit H<sub>2</sub>-Gasinhalation zeigte keine beobachtbaren nachteiligen Wirkungen und keine Komplikationen und verbesserte den Sauerstoffsättigungsgrad.“
- „die Auswirkungen der Inhalation von H<sub>2</sub> waren vorteilhafter als die Verabreichung von Edaravon.“
- „Bei der Bewertung der Wirkung durch H<sub>2</sub>-Inhalation war der NIHSS-Score in der H<sub>2</sub>-Gruppe signifikant besser als in der Kontrollgruppe“
- „Der BI-Score in der H<sub>2</sub>-Gruppe zeigte eine signifikantere Verbesserung als in der Kontrollgruppe, wohingegen die besseren Verbesserungen in den BRS-, mRS- und FIM-Indizes nur Trends in der H<sub>2</sub>-Gruppe zeigten.“
- „Da inhaliertes H<sub>2</sub>-Gas schnell wirkt, könnte es durch einen schnellen Anstieg des H<sub>2</sub>-Gehalts zur Abwehr von akutem oxidativem Stress im Notfall geeignet sein . <sup>1</sup>Darüber hinaus ist in vielen akuten klinischen Situationen ein Flüssigkeitsüberschuss verboten und die orale Verabreichung ist tatsächlich unmöglich. Daher kann die Inhalation der sicherste Weg für die H<sub>2</sub>-Behandlung sein.“





# 2017: Bewertung von H<sub>2</sub> Inhalation und H<sub>2</sub> Trinken

## Molekularer Wasserstoff: ein vorbeugendes und therapeutisches medizinisches Gas für verschiedene Krankheiten

Ge L, Yang M, Yang NN, Yin XX, Song WG. Molecular hydrogen: a preventive and therapeutic medical gas for various diseases. *Oncotarget*. 2017;8(60):102653-102673. Published 2017 Sep 21. doi:10.18632/oncotarget.21130

- „**Inhaliertes H<sub>2</sub>** wirkt schnell und kann zur Behandlung von akutem oxidativem Stress eingesetzt werden,“ „Die Inhalation von H<sub>2</sub> verursachte keine beobachtbaren Nebenwirkungen und hatte keine Auswirkungen auf den Blutdruck [ [1](#) ] oder andere Blutparameter wie Temperatur, pH-Wert und pO<sub>2</sub> [ [52](#) ]. Bei Patienten mit akutem Hirninfarkt war die Inhalation von H<sub>2</sub> sicher und wirksam [ [53](#) ]. Neuere Erkenntnisse legen nahe, dass H<sub>2</sub> Die Behandlung ist bei Patienten mit zerebralen I / R-Verletzungen neuroprotektiv [ [54](#) ]. H<sub>2</sub> mildert außerdem die durch chirurgische Eingriffe hervorgerufene kognitive Beeinträchtigung [ [55](#) ], verringert die Lungentransplantatverletzung [ [56](#) ] und die strahlungsinduzierte Hautverletzung bei Ratten [ [57](#) ] und die durch Lipopolysaccharid induzierte akute Lungenverletzung bei Mäusen [ [14](#) ].“
- **Orale Einnahme von wasserstoffreichem Wasser (HW):** “Im Gegensatz zu gasförmigem H<sub>2</sub> ist solubilisiertes H<sub>2</sub> [H<sub>2</sub> gelöstes Wasser oder wasserstoffreiches Wasser (HW)] tragbar, sicher und leicht zu verabreichen [ [58](#) ]. H<sub>2</sub> kann in Wasser bis zu 0,8 mM (1,6 mg / l) unter Atmosphärendruck bei Raumtemperatur gelöst werden, ohne den pH-Wert zu verändern, und 0,8 mM HW verbesserten wirksam die Fettleibigkeit im Mäusemodell [ [59](#) ]..... In-vitro-Experimente zeigten, dass Kohlenhydratpolymere, einschließlich Glykogen und Stärke, eine Affinität für H<sub>2</sub> aufweisen [ [60](#) ], und einige Studien haben gezeigt, dass das Trinken von HW positive Auswirkungen auf Krankheitsmodelle wie Parkinson-Krankheit [ [61](#) ] und orale Gaumenwunde hat [ [62](#) ], strahlungsinduzierte oxidative Verletzungen [ [63](#) ], periodontale Gewebealterung [ [64](#) ] und depressives Verhalten [ [65](#) ].“



# 2018 Humanstudie zum Trinken und Sport

## Auswirkungen von Wasserstoff reichen Wasser (HRW) auf längere intermittierende Bewegung.

Da Ponte A, Giovanelli N, Nigris D, Lazzer, S. Effects of hydrogen rich water on prolonged intermittent exercise. [J Sports Med Phys Fitness](#). 2018 May;58(5):612-621. doi: 10.23736/S0022-470717.06883-9. Epub 2017 Apr 26.

- “Wir untersuchten eine 2-wöchige HRW-Aufnahme bei wiederholter Sprintleistung und den Säure-Base-Status während längerer intermittierender Radsportübungen.”
- „In einem Cross-over-Single-Blind-Protokoll waren 8 ausgebildete männliche Radfahrer (Alter [Mittelwert  $\pm$  SD]  $41 \pm 7$  Jahre, Körpermasse  $72,3 \pm 4,4$  kg, Höhe  $1,77 \pm 0,04$  m), maximale Sauerstoffaufnahme [VO<sub>2</sub>max]  $52,6 \pm 4,4$  ml  $\cdot$  kg<sup>-1</sup>  $\cdot$  min<sup>-1</sup>) wurden täglich mit 2 Litern placebo normalen bereitgestellt Wasser (PLA, pH 7,6, Oxidations- / Reduktionspotential [ORP] +230 mV, freier Wasserstoffgehalt 0 ppb) oder HRW (pH 9,8, ORP -180 mV, freier Wasserstoff 450 ppb.)“
- „In der Placebo Gruppe nahm der Wert der Spitzenleistungsabgabe (PPO) in den absoluten Werten beim 8. und 9. von 10 Sprints signifikant ab und in den relativen Werten nahm  $\Delta$ PPO im 6., 8. und 9. von 10 Sprints signifikant ab (im Mittel:  $-12 \pm 5\%$ ,  $P < 0,006$ ), während es in der HRW-Gruppe unverändert blieb. Durchschnittsleistung, Ermüdungsindex, Zeit bis zur Höchstleistung und Gesamtarbeit zeigten keine Unterschiede zwischen den Gruppen. In beiden Zuständen stieg der Laktatspiegel an, während der pH-Wert und der HCO<sub>3</sub>-Wert in Abhängigkeit von der Anzahl der Sprints progressiv abnahmen.“
- „Eine zweiwöchige HRW-Aufnahme kann dazu beitragen, den PPO-Wert in sich wiederholenden Sprints über 30 Minuten bis zur Erschöpfung zu halten.“



# 2018: -Mundhygiene: H<sub>2</sub> Wasser gegen Biofilm

## Die Hemmung von Streptokokken - Biofilm im Mund durch Wasserstoffwasser

Kim J, Lee HJ, Hong SH; Inhibition of streptococcal biofilm by hydrogen water. [J Dent.](#) 2017 Mar; 58: 34-39. doi: 10.1016/j.jdent.2017.01.004. Epub 2017 Jan 10

- „Zusätzlich zu seinem allgemeinen gesundheitlichen Nutzen hat H- Wasser eine antibakterielle Wirkung für krankheitsassoziierte Mundbakterien.“
- „Ziel dieser Studie war es, die Wirkung von H- Wasser auf die Bildung von Streptokokken-Biofilm zu bestätigen.“
- „In vitro-Streptokokken-Biofilm wurde unter Verwendung von Kristallviolett-Färbung nach Kultur auf einer Polystyrolplatte quantifiziert.“
- „Unsere Daten zeigten, dass Wasserstoffwasser die In-vitro-Bildung von Streptokokken-Biofilmen signifikant verringert. Das Expressionsniveau der mRNA von Glucosyltransferasen (gtfB, GtfC und gtfI) und Glucan-bindenden Proteinen (GBPC, dblB) wurde deutlich verringert“
- „Mundspülung mit Wasserstoffwasser führte innerhalb 1 Woche zu deutlich weniger Speichel-Streptokokken als hätte man mit Leitungswasser gespült.“
- „Unsere Daten deuten darauf hin, dass eine orale Spülung mit Wasserstoffwasser hilfreich ist, um zahnbiofilmabhängige Erkrankungen einfach und effizient zu behandeln.“





# 2018: Darmbakterien + Parkinson

## Quantifizierung der Wasserstoffproduktion durch Darmbakterien, die spezifisch bei Parkinson-Krankheit dysreguliert sind

Suzuki A, Ito M, Hamaguchi T, et al. Quantification of hydrogen production by intestinal bacteria that are specifically dysregulated in Parkinson's disease. *PLoS One*. 2018;13(12):e0208313. Published 2018 Dec 26. doi:10.1371/journal.pone.0208313

- „Die verringerte Wasserstoffproduktion durch Darmmikrobiota kann mit der Entwicklung und dem Fortschreiten der Parkinsonkrankheit (PD) zusammenhängen. Wir haben die Menge der Wasserstoffproduktion durch Gaschromatographie mit sieben Bakterienstämmen gemessen...und fanden heraus, dass PD-Patienten im Vergleich zu Kontrollen eine 2,2-fach geringere Menge an Darmwasserstoff produzieren. .“
- „Bei oraler Einnahme von Lactulose entsteht als Nebenprodukt Wasserstoff [ [43](#) ]. Die Wasserstoffkonzentrationen stiegen sowohl bei Kontrollen als auch bei PD-Patienten allmählich an. Allerdings waren die Wasserstoffkonzentrationen bei 180 Minuten bei Kontrollen 1,5-fach höher als bei PD, was mit unserer Simulation übereinstimmte, dass die von Darmmikrobiota bei Kontrollen erzeugte Wasserstoffmenge 1,69-mal höher war als bei PD ( [3](#) ). Diese Beobachtungen stützen die Vorstellung, dass wasserstoffproduzierende Bakterien im Vergleich zu Kontrollen weniger häufig bei PD vorhanden sind.“



# 2018 Basisches H<sub>2</sub> Wasser Fettleber (Tiermodell)

## Auswirkungen von alkalisch-elektrolysiertem und wasserstoffreichem Wasser in einem Mausmodell mit nichtalkoholischer Fettleber mit fettreicher Diät

Jackson K, Dressler N, Ben-Shushan RS, Meerson A, LeBaron TW, Tamir S. Effects of alkaline-electrolyzed and hydrogen-rich water, in a high-fat-diet nonalcoholic fatty liver disease mouse model. World J Gastroenterol. 2018;24(45):5095-5108.

- Mäuse, bei denen eine Fettleber erzeugt wurde, dienten zur Analyse der Auswirkungen von Basischem Elektrolytwasser EAW, Wasserstoffwasser mit geringem H<sub>2</sub> Gehalt L-HRW und wasserstoffreicherem Wasser H-HRW)
- EAW wurde mit einem Wasser-Ionisator-Batch-System (BTM-3000) hergestellt (pH 11 ± 0,48, Redoxpotential von -495 ± 27 mV, H<sub>2</sub> ≥ 0,2 mg / L).“
- HRW und H-HRW wurden unter Verwendung von metallischem Magnesium hergestellt. (H-HRW 0,8 mg / l) und (HRW 0,3 mg / l) H<sub>2</sub> Konzentration. pH 8.
- Mäuse in der H-HRW-Gruppe zeigten einen geringeren Anstieg des Fettgewebes im Vergleich zu den beiden anderen Gruppen (p = 0,002). Am Ende zeigten Mäuse in der H-HRW-Gruppe 46% Fettmasse und 42% Magermasse, verglichen mit 61% Fettmasse und 28% Magermasse der Kontrollgruppe.
- „Die Unterdrückung der Fettzunahme durch H-HRW kann auf die Fähigkeit von Wasserstoff zurückzuführen sein, das Leberhormon Fibroblasten-Wachstumsfaktor-21 (FGF21) zu induzieren, was zu einem erhöhten Energieaufwand führt“
- Diese Studie zeigte, dass das in Wasser gelöstes H<sub>2</sub> das therapeutische Mittel in funktionellen Wässern ist, da elektrolysiertes Wasser mit einem hohen pH-Wert und einem negativen ORP keinen Einfluss auf die Verhinderung der Entwicklung von NAFLD zeigte.
- Weder EAW noch L-HRW hatten Schutzwirkungen. ...Es ist nicht bekannt, warum Mäuse in der H-HRW-Gruppe fast dreimal mehr Wasser zu sich nahmen.



# Forschungsüberblick 2018

## Neue Mechanismen und neuartige Anwendungen der Wasserstoffgastherapie

- Matei N, Camara R, Zhang JH. Emerging mechanisms and novel applications of hydrogen gas therapy. *Med Gas Res.* 2018;8(3):98-102. Published 2018 Sep 25. doi:10.4103/2045-9912.239959blished 2018 Sep 25. doi:10.4103/2045-9912.239959

Diese Übersichtsarbeit von spiegelt den Stand von 2018 wieder.

- „Molekularer Wasserstoff wird üblicherweise durch Inhalieren von Wasserstoff enthaltender Luft (HCA) oder durch orale Einnahme von Wasserstoffwasser (HW) verabreicht. [19](#) Inhaliertes Wasserstoffgas eignet sich aufgrund seines schnellen Wirkmechanismus am besten für die Abwehr akuten oxidativen Stress in Notsituationen. [16](#) Im Vergleich dazu zeigten überlegene HCA Verteilung von Wasserstoff sowohl atriale und arteriellem Blut, während der Wasserstoffkonzentration durch HW 10x im atrialen Blut im Vergleich zu dem des arteriellen Blut erhöht.“
- „Klassisch war die herkömmliche Antioxidantientherapie begrenzt, da sie sowohl die schädlichen als auch die schützenden Wirkungen von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) neutralisierte: stark oxidierende ROS, z. B. OH, die Gewebe und vorteilhafte Spezies schädigen, Superoxid und Wasserstoffperoxid, die den endogenen Schutz verstärken Signalübertragungswege. [3](#) Als schwaches Reduktionsmittel vermeidet Wasserstoffgas dieses Paradoxon, indem es mit starken Oxidationsmitteln, z. B. OH, reagiert, während andere nützliche Oxidationsmittel reaktiv bleiben. [3](#)“
- „Die einzigartigen reduzierenden Eigenschaften von Wasserstoff wurden genutzt, um eine Vielzahl oxidativer Stresspathologien zu behandeln. Akuter oxidativer Stress entwickelt sich aus heftigen körperlichen Anstrengungen, Entzündungen, Ischämie und Reperfusionsverletzungen (I / R), chirurgischen Blutungen und Gewebetransplantationen.“





# 2019 Grundlagenforschung: Zellalterung

## Wasserstoff unterdrückt indirekt die Zunahme von Wasserstoffperoxid in durch Cytoplasma-Hydroxyl-Radikale induzierten Zellen und unterdrückt die zelluläre Seneszenz

Sakai T, Kurokawa R, Hirano SI, Imai J. Hydrogen Indirectly Suppresses Increases in Hydrogen Peroxide in Cytoplasmic Hydroxyl Radical-Induced Cells and Suppresses Cellular Senescence. Int J Mol Sci. 2019;20(2):456. Published 2019 Jan 21. doi:10.3390/ijms20020456

- „In dieser Studie haben wir herausgefunden, dass das Abfangen von Cyto OH durch  $H_2$  indirekt den Anstieg von  $H_2O_2$  und die zelluläre Seneszenz in einem durch Cyto OH induzierten zellulären Seneszenzmodell unterdrückt. Es ist bekannt, dass  $H_2$  die zelluläre Seneszenz sowie die Expression von p16 und p21 in anderen ROS-induzierten zellulären Seneszenzmodellen unterdrückt, was die Ergebnisse unserer Studie unterstützt [ [13](#) , [14](#) , [15](#) , [16](#) ].  $H_2$  reduzierte die Spiegel anderer intrazellulärer ROS, obwohl es ein OH-spezifischer Fänger ist.“
- „ Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass  $H_2$  ist ein vielversprechendes Molekül zur Unterdrückung zellulärer Alterskrankheiten und kann Auswirkungen auf die Bekämpfung geriatrischer Erkrankungen haben. Daher kann die Erhöhung der  $H_2$  -Produktion durch Darmbakterien unter Verwendung von MAC mit hoher Wahrscheinlichkeit die durch Cyto OH induzierte zelluläre Seneszenz unterdrücken und die individuelle Alterung hemmen.“





*AQUAVOLTA*®

**H<sub>2</sub> Technology**

**kontinuierlich auf dem  
neuesten Stand des  
Wissens und der Technik**